

Hvad är nu att göra mot den amerikanska krusbärsmjöldaggen?.

Lind, Gustaf Herman

12 H Br.



National Library
of Sweden

Don:
Frädag
(C)

VAD

HVAD ÄR NU ATT GÖRA

MOT

DEN AMERIKANSKA KRUSBÄRSMJÖLDAGGEN?

AF

GUSTAF LIND

AFTRYCK UR HANDTVERKS- OCH LANDTMANNABLADET



STOCKHOLM
AFTONBLADETS TRYCKERI 1907



HAUD ÄR NU ATT GÖRA


TOM

DEM AMERIKANSKA KUNDBÄSKNUTLÖDGERNA

SA

GUZZAN LIND

FRISÄTTNINGEN AV HÄR SKEDDE I 1874



1874



ha gjort vid Adelsnäs trädgårdar, med det resultat, att svampen ännu, enligt hvad som därifrån meddelats, icke kunnat upptäckas på en enda buske.

Hvad beträffar de nio vid Experimentalfältet i år sjuka buskarna, så ligger det antagandet äfven nära till hands, att dessa på något sätt blifvit smittade i år.

Ända sedan medlet af juni har nämligen en mängd försändelser med sjuka krusbärsskott och kart ankommit dit, hvarjämte en del främlingar från nedsmittade trädgårdar där aflagt besök. Det vore därför icke så underligt, om äfven fastän den största försiktighet iakttagits, sjukdomen i år på nytt kunnat ha öfverförts dit.

Erfarenheten från flere andra trädgårdar, där man under förra sommaren oafbrutet bortklippte de sjuka årsskotten, är alltigenom gynnsam, hvad resultatet af toppklippningen beträffar.

Med stöd af sålunda vunnen erfarenhet skulle man därför i frågans nuvarande läge kunna tillråda följande åtgärder:

1) Alla sjuka bär afplockas och upptränas. Är angreppet svårare, dvs. om ett större antal bär äro sjuka, gör man nog klokast i att samtidigt afplocka och använda de friska bären, enär dessa sannolikt eljes snart nog blifva sjuka. Äro endast enstaka bär angripna, kan man ju försöksvis bortplocka dessa för att möjligen kunna rädda några bär för mognad.

2) Alla årsskott afklippas genast som svampen visar sig å desamma. Denna skottklippning fortsättes hela sommaren igenom ända till kort före löffällningen.

Såväl afplockningen af de sjuka bären som skottklippningen bör aldrig företagas när blåst råder, utan endast vid lugnt väder. Skotten afklippas bäst medels en liten lätt sekator samt nedläggas försiktigt, så att de mycket löst sittande svampsporerne ej spridas omkring, i en

medförd trädgårdskanna eller annat lämpligt kärl. När detta är fyllt, tömmes innehållet i spiseln eller ock gör man upp eld i det fria och förbränner skotten.

3) Efter löffällningen om hösten nedskäras krusbärsbuskarna så skarpt, att man är fullt förvissad om, att inga årsskott eller delar af sådana finnas kvar, dvs. man skär ned på två eller tre års sveden.

Det afskurna riset upptrännes, hvar efter jorden under och omkring krusbärsbuskarna kalkas rikligt.

4) Då erfarenheten visat, att smittan till kanske hufvudsaklig del sprides med människors kläder, bör man så mycket som sig göra låter söka isolera krusbärsplanteringen och aldrig tillåta någon annan än den, som nödvändigt måste beträda densamma att komma i minsta beröring med krusbärsbuskarna. Den som sysslar bland sjuka buskar med skottklippning, bärplockning o. d., bör absolut undvika att besöka främmande trädgårdar, där buskarna ännu äro friska, ja, han bör icke ens ströfva bland de tilläfventyrs friska buskarna i den egna trädgården.

I hvad mån andra åtgärder till sjukdomens bekämpande kunna visa sig lämpliga, torde f. n. ej kunna afgöras.

Att nu genast nedskära buskarna till marken kan tyckas vara effektivt, men det är å andra sidan att befara, att buskarna ej tåla vid så skarp beskärning midt under vegetationsperioden utan gå förlorade, och då är ju ej mycket vunnit. Besprutningar med den ena eller andra vätskan ha, enligt hvad hittills utförda försök utvisa, haft föga verkan. Med rökning af svafvelblomma, medels de af våra rosodlare väl kända Campbells apparater, såväl som med den i vintras mycket omskrifna apparaten »Bolm», pågå f. n. försök i några trädgårdar. Huru dessa försök komma att slå ut, kan dock ännu ej afgöras.

Experimentalfältet den 2 juli 1907.