



**National Library
of Sweden**

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1958:39

Inrikesdepartementet



Tabellbilaga till
mentalsjukvårdsdelegationens betänkande III

MENTALSJUKVÅRDEN

PLANERING OCH ORGANISATION

Stockholm 1958

Statens offentliga utredningar 1958

Kronologisk förteckning

1. Vägplan för Sverige. 1. Riktlinjer och förslag samt katbilagor. Idun. 226 s. K.
2. Vägplan för Sverige. 2. Expertutredningar och övriga txtbilagor. Idun. 243 s. K.
3. Utredning om vissa förhållanden vid konserveringsförkningsinstitutet. Marcus. 270 s. H.
4. Promemoria med förslag om fondförvaltning m. m. i samband med en utbyggd pensionering. Idun. 91 s. S.
5. Permanent skördeskadeskydd. Idun. 547 s. Jo.
6. Författningsutredningen. 1. Kandidatnominering vid andakammarval. Av L. Sköld. Idun. 355 s. Ju.
7. Småbrularstödet. Marcus. 120 s. Jo.
8. Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning. Norstedt. 95 s. I.
9. Häradsritts sammansättning i brottmål. Idun. 24 s. Ju.
10. Förslag till varumärkeslag. Idun. 464 s. Ju.
11. Reserverna för högre utbildning. Idun. 124 s. E.
12. Civilförsvarsutbildningen. Idun. 176 s. I.
13. Civilförsvarets organisation. Idun. 465 s. I.
14. Regeringsarbetet. Idun. 164 s. Ju.
15. Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena. Idun. 429 s. I.
16. Betänkaide med förslag till allmän tjänstepliktslag m. m. Idun. 154 s. S.
17. Socialförsäkring och rehabilitering. Kihlström. 87 s. S.
18. Gotland. Idun. 195 s. S.
19. Supplement nr 9 till Sveriges familjenamn 1920. Statens reproduktionsanstalt. 95 s. Fl.
20. Behandlingshem och mentalsjukhem för barn och ungdomar. Idun. 78 s. I.
21. Lärarbrist och läraröverskott. Idun. 110 s. E.
22. Tornedautredningen. Idun. 234 s. S.
23. Sjukresersättningar. Kihlström. 128 s. S.
24. Bättre natpotatis. Idun. 91 s. Jo.
25. Andrad utbildning av tandtekniker. Idun. 56 s. E.
26. Regionsjukvården. Idun. 338 s. 7 st. bilagor. I.
27. Förslag till förenklingar i vissa delar av aktiebolagslagen. Norstedt. 205 s. Ju.
28. Reviderad nationalbudget för år 1958. Marcus. I-VII + 157 s. Fl.
29. Författningsutredningen. 3. Majoritetsval. Norstedt. 48 s. + 1 kartbilaga. Ju.
30. Skogsvården å enskilda skogar. Idun. 279 s. Jo.
31. Nordiskt ekonomiskt samarbete. Idun. 136 s. H.
32. Forsknarens villkor och behov. Idun. 291 s. E.
33. Sjöbefälsutbildningens organisation m. m. Idun. 178 s. H.
34. Socialpolis och kvinnlig polis. Idun. 92 s. I.
35. Förlust- och resultatutjämnning. Idun. 199 s. Fl.
36. Nettopriindex. Marcus. 124 s. Fl.
37. Statsbidrag till anordnande av skolmåltider. Idun. 67 s. E.
38. Mentalsjukvårdens nydaning. Idun. 525 s. I.
39. Tabellbilaga till mentalsjukvårdsdelegationens betänkaide III. Idun. 90 s. I.

Anm. Om särskild tryckort ej anges, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelsebokstäverna till det departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet, Jo. = jordbruksdepartementet.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1958:39

Inrikesdepartementet



Tabellbilaga till
mentalsjukvårdsdelegationens betänkande III

MENTALSJUKVÅRDEN

PLANERING OCH ORGANISATION

IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG ESSELTE AB
STOCKHOLM 1958

Innehåll

Neuroundersökningen i Stockholm år 1957

<i>Undersökningens syfte och genomförande</i>	7
Syfte.	7
Urval	7
Fältarbete	7
Bortfall	8
De intervjuades inställning	9
Formulär	9
Intervjumaterialets sammansättning	10
<i>Redovisning av intervjusvaren</i>	14
Subjektiva symtom och besvär	14
Sömn och sömngående	22
Symtomens varaktighet och svårhetsgrad	24
Medicinförbrukning och tidigare sökt hjälp	29
Behov av hjälp för nervösa symtom	33
<i>Läkarbedömningar på grundval av intervjusvaren</i>	38
Inledning	38
Förfaringssätt	38
Resultat	39
Vissa uppskattningar av totala värden för hela den vuxna befolkningen i Stockholm	53
<i>Sammanfattande diskussion</i>	56
<i>Intervjuformulär</i>	57

Fältundersökningen i Hallands län år 1957

Tabeller utarbetade av statistiska centralbyråns utredningsinstitut	71
---	----

NEUROSUNDERSÖKNINGEN 1957

*Rapport angående intervjuundersökning
rörande förekomsten av nervösa besvär bland den vuxna
befolkningen i Stockholm våren 1957, avgiven av
statistiska centralbyråns utredningsinstitut
den 24 mars 1958*

Undersökningens syfte och genomförande

Syfte

Statistiska centralbyråns utredningsinstitut har på uppdrag av mentalsjukvårdsdelegationen och Stockholms stads sjukhusdirektion under våren 1957 gjort en intervjuundersökning bland den vuxna befolkningen i Stockholm rörande förekomsten av nervösa besvär. Undersökningens syfte är att försöka ge ett bidrag till frågan om vårdbehovet för lättare psykiska åkommor (»neuroser»).

Urval

Populationen utgjordes av individer, födda före 1 januari 1937 och mantalskrivna i Stockholm den 1 november 1956. Det beslöts, att 550 personer skulle ingå i undersökningen. Urvalet drogs ur mantalslängderna med hjälp av s. k. slumpstalstabeller, varvid längdernas löpande registreringsnummer användes som identifieringsnummer. Samplingen gjordes församlingsvis, i proportion till församlingarnas storlek. Tillräckligt antal slumpstal drogs för att täcka de »blindnummer», som påträffades, d. v. s. registreringsnummer avseende individer födda efter 1 januari 1937, fastigheter och fastighetsägare, kvartersnummer m. m. Genom att i 3 fall de utlottade individerna visade sig icke vara bosatta i Stockholm, kom urvalet att omfatta 547 individer.

Fältarbete

Intervjuarbetet startade måndagen den 18 mars 1957 och pågick sedan till mitten av maj samma år. Urvalet fördelades på intervjuarna på följande sätt. På grund av att vissa frågor i formuläret gällde menstruationens inverkan, ansågs det lämpligt att begagna kvinnliga ombud vid intervjuer med kvinnor födda 1907 eller senare. Dessa intervjupersoner fördelades slumpmässigt på de kvinnliga intervjuarna. Fördelningen på intervjuare beträffande övriga utvalda personer skedde också slumpmässigt. Avsikten därmed var i första hand att möjliggöra en eventuell analys av intervjuareffekter. Praktiskt betydde det ett något mer tidskrävande arbete för intervjuarna på grund av långa resor inom staden.

Bortfall

Följande tablå visar antal genomförda intervjuer samt bortfallet med fördelning på olika bortfallsanledningar:

	Antal	I procent
Ursprungligt urval	547	100,0
Genomförda intervjuer	488	89,2
Ej genomförda intervjuer	59	10,8
varav		
vägrare	25	4,6
oanträffade, flyttade, bortresta..	16	2,9
döda, sjuka	10	1,8
intagna på anstalter	8	1,5

Nedanstående tablåer visar bortfallet med fördelning på kön, ålder och civilstånd.

Jämförelser mellan ursprungligt urval och bortfall

	Urval	Bortfall	I procent
<i>Kön</i>			
Män	254	31	12,2
Kvinnor	293	28	9,6
<i>Åldersgrupp</i>			
20—34 år	158	17	10,8
35—49 »	186	24	12,9
50—64 »	125	4	3,2
65— »	78	14	17,9
<i>Civilstånd</i>			
Ogift	134	23	17,2
Gift	335	24	7,2
Änka/änkling	40	7	17,5
Frånskild	38	5	13,2

Tydligt ligger bortfallet högre i åldersgrupperna 35—49 år och 65 år och däröver än bland övriga åldersgrupper och vidare är bortfallsprocenten större bland ogifta än bland gifta. Det är egentligen rätt naturligt att bortfallsgruppen i viss mån avviker från de intervjuade i olika avseenden. Bortfall åstadkommes givetvis inte helt genom slumpen. Dödlighet och sjuklighet är starkt betingade av ålder, och civilstånd är otvivelaktigt av betydelse för anträffbarheten i bostaden. Intagna på anstalt utgör en selektiv grupp.

Sammanfattningsvis kan konstateras att bortfallet uppgår till 10,8 %, varav den viktigaste bortfallsanledningen utgöres av vägran i 4,6 % av fallen. Ehuru siffrorna ligger högt i jämförelse med andra intervjuundersökningar, som utredningsinstitutet utfört, får resultatet dock betecknas som rätt bra med tanke på det känsliga ämnesområdet för undersökningen.

Rent logiskt kan man fastslå, att den eventuella snedvridningen av de redovisade frekvenserna inte kan överstiga 10 %; troligen är den snedvridande effekten mindre.

De intervjuades inställning

Enligt intervjuarnas uppgifter var allmänhetens inställning till intervjun genomgående positiv. De farhågor, som man i förväg tyckt sig ha anledning hysa, visade sig ogrundade. Tab. 1 nedan redovisar de intervjuade med hänsyn till inställning före och efter intervjun i kombination med intervjusituationen, d. v. s. om intervjun skett i enrum eller i närvaro av annan person.

Formulär

Konstruktionen av frågeformuläret har skett i samarbete med uppdragsgivarna. Formuläret har i stort sett fyra avdelningar:

- I Vissa bakgrundsdata om intervjupersonen samt om bostaden
- II Förekomst av nervösa symtom
- III Tidigare sökt och erhållen hjälp för fysiska och psykiska besvär
- IV Inställning till behov av hjälp för psykiska besvär.

Tabell 1. Intervjusituation. Fördelning efter inställning till intervju, före och efter

Inställning till intervju före och efter			Intervjusituation							
			Antal					Procent		
			i enrum med Ip	i närvaro av an. fam.-medl.	annan situation	uppgift saknas	summa intervjuer	i enrum med Ip	i närvaro av an. fam.-medl.	summa intervjuer
Män										
Positiv	före, positiv	efter...	130	25	6	1	162	76,0	67,6	72,7
»	», obestämd	» ...	2	—	—	—	2	1,2	—	0,9
»	», negativ	» ...	—	—	—	—	—	—	—	—
Obestämd	», positiv	» ...	11	5	2	—	18	6,4	13,5	8,1
»	», obestämd	» ...	18	6	3	1	28	10,5	16,2	12,6
»	», negativ	» ...	2	—	—	—	2	1,2	—	0,9
Negativ	», positiv	» ...	4	—	—	—	4	2,3	—	1,8
»	», obestämd	» ...	3	1	1	—	5	1,8	2,7	2,2
»	», negativ	» ...	1	—	—	—	1	0,6	—	0,4
Uppgift saknas			—	—	1	—	1	—	—	0,4
Summa			171	37	13	2	223	100,0	100,0	100,0
Kvinnor										
Positiv	före, positiv	efter...	135	13	5	3	156	59,5	56,5	58,9
»	», obestämd	» ...	3	1	1	—	5	1,3	4,4	1,9
»	», negativ	» ...	—	—	—	—	—	—	—	—
Obestämd	», positiv	» ...	46	4	1	—	51	20,3	17,4	19,2
»	», obestämd	» ...	31	5	1	—	37	13,6	21,7	14,0
»	», negativ	» ...	4	—	1	—	5	1,8	—	1,9
Negativ	», positiv	» ...	1	—	—	—	1	0,4	—	0,4
»	», obestämd	» ...	5	—	3	—	8	2,2	—	3,0
»	», negativ	» ...	2	—	—	—	2	0,9	—	0,7
Uppgift saknas			—	—	—	—	—	—	—	—
Summa			227	23	12	3	265	100,0	100,0	100,0

Ett 40-tal provintervjuer, som gjordes under februari 1957, tydde på att undersökningen var möjlig att genomföra trots frågornas art. Efter provintervjuerna gjordes vissa justeringar i formuläret på basis av vunna erfarenheter. På grundval av de antecknade svaren i frågeformulären har tvenne läkare — medicinalrådet Curt Åmark och socialläkaren Gunnar Inghe — bedömt varje intervjuperson med avseende på fysiskt och psykiskt hälsotillstånd samt behov av konsultation för nervösa besvär. Instruktionen för intervjuarna att nedteckna de intervjuades svar ordagrant på alla frågor ansågs underlätta en sådan bedömning.

Intervjumaterialets sammansättning

De intervjuades sammansättning i olika avseenden finnes redovisat i fem tabeller:

Tab. 2 Stockholms befolkning över 20 år och intervjupersonerna fördelade på kön och åldersgrupper (20—34, 35—49, 50—64, 65 år och däröver).

Tab. 3 Stockholms befolkning över 20 år och intervjupersonerna fördelade på kön och stadsdelar (inre staden, Söderort och Västerort).

Tab. 4 Fördelning på kön, barnantal och stadsdelar.

Tab. 5 Fördelning på kön, familjetyp (gifta par med resp. utan barn, icke gifta med resp. utan barn) och stadsdelar.

Tab. 6 Fördelning på kön, socialgrupp (I, II och III) och stadsdelar.

Tab. 7 Fördelning på kön, yrkeställning (företagare, förvaltningspersonal, arbetare, ej yrkesverksamma) och stadsdelar.

Tabell 2. Jämförelse mellan intervjupersonernas och stockholmsbefolkningens fördelning på ålder och kön

Ålder	Intervjupersoner			Hela befolkningen i Stockholm över 20 år den 1 nov. 1956		
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen
<i>Absoluta tal</i>						
20—34 år.....	61	80	141	78 657	83 956	162 613
35—49 ».....	89	73	162	91 233	102 700	193 933
50—64 ».....	48	73	121	62 484	82 570	145 054
65— ».....	25	39	64	32 242	52 163	84 405
Summa	223	265	488	264 616	321 389	586 005
<i>Relativ fördelning</i>						
20—34 år.....	27,4	30,2	28,9	29,7	26,1	27,7
35—49 ».....	39,9	27,6	33,2	34,5	32,0	33,1
50—64 ».....	21,5	27,5	24,8	23,6	25,7	24,8
65— ».....	11,2	14,7	13,1	12,2	16,2	14,4
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sammansättningen av de intervjuade återspeglar som man kan vänta mycket väl de olikheter med avseende på socialskikt, familjestruktur och barnantal, som föreligger mellan inre staden, Söderort och Västerort.

Tabell 3. Jämförelse mellan intervjupersonernas och stockholmsbefolkningens procentuella fördelning på kön och stadsdelar

Kön	»Stadsdelar»							
	Inre staden	Söderort	Västerort	Hela staden	Inre staden	Söderort	Västerort	Hela staden
	Intervjupersoner				Hela folkmängden i åldern 21 år och däröver			
Män.....	40,9	51,1	47,4	45,7	43,0	48,1	47,1	45,2
Kvinnor.....	59,1	48,9	52,6	54,3	57,0	51,9	52,9	54,8
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Män.....	42,6	41,3	16,1	100,0	51,6	31,8	16,6	100,0
Kvinnor.....	51,7	33,2	15,1	100,0	56,3	28,3	15,4	100,0
Summa	47,5	36,9	15,6	100,0	54,2	29,9	15,9	100,0

Tabell 4. Fördelning på stadsdel, kön och antal barn i hushållet

Kön Barnantal	»Stadsdelar»							
	Inre staden	Söderort	Västerort	Hela staden	Inre staden	Söderort	Västerort	Hela staden
	Antal				I procent			
<i>Män</i>								
0 barn.....	78	44	18	140	82,1	47,8	50,0	62,8
1 ».....	11	22	11	44	11,6	23,9	30,6	19,7
2 ».....	5	15	3	23	5,3	16,3	8,3	10,3
3 o. fl. barn...	1	11	4	16	1,0	12,0	11,1	7,2
Summa	95	92	36	223	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Kvinnor</i>								
0 barn.....	111	32	20	163	81,0	36,4	50,0	61,5
1 ».....	16	29	7	52	11,7	32,9	17,5	19,6
2 ».....	7	18	10	35	5,1	20,5	25,0	13,2
3 o. fl. barn...	3	9	3	15	2,2	10,2	7,5	5,7
Summa	137	88	40	265	100,0	100,0	100,0	100,0
Totalt	232	180	76	488	—	—	—	—

Tabell 5. Fördelning på stadsdel, kön och familjetyp

Kön Familjetyp	»Stadsdelar»							
	Inre staden	Söder-ort	Väs-terort	Hela staden	Inre staden	Söder-ort	Väs-terort	Hela staden
	Antal				I procent			
<i>Män</i>								
Gifta par med barn.....	24	53	22	99	25,3	57,6	61,1	44,3
» » utan barn.....	31	17	7	55	32,6	18,5	19,4	24,7
Icke gifta med barn.....	3	—	2	5	3,2	—	5,6	2,2
» » utan barn.....	37	22	5	64	38,9	23,9	13,9	28,7
Summa	95	92	36	223	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Kvinnor</i>								
Gifta par med barn.....	30	59	23	112	21,9	67,0	57,5	42,3
» » utan barn.....	29	11	7	47	21,1	12,5	17,5	17,7
Icke gifta med barn.....	11	4	2	17	8,0	4,6	5,0	6,4
» » utan barn.....	67	14	8	89	48,9	15,9	20,0	33,6
Summa	137	88	40	265	100,0	100,0	100,0	100,0
Totalt	232	180	76	488	—	—	—	—

Tabell 6. Fördelning på stadsdel, kön och socialgrupp

Kön Socialgrupp	»Stadsdelar»							
	Inre staden	Söderort	Väster-ort	Hela staden	Inre staden	Söderort	Väster-ort	Hela staden
	Antal				I procent			
<i>Män</i>								
Socialgrupp 1..	14	12	9	35	14,7	13,0	25,0	15,7
» 2..	37	38	18	93	39,0	41,3	50,0	41,7
» 3..	44	42	9	95	46,3	45,7	25,0	42,6
» okänd	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	95	92	36	223	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Kvinnor</i>								
Socialgrupp 1..	21	8	8	37	15,3	9,1	20,0	14,0
» 2..	64	37	19	120	46,7	42,0	47,5	45,3
» 3..	47	41	12	100	34,3	46,6	30,0	37,7
» okänd	5	2	1	8	3,7	2,3	2,5	3,0
Summa	137	88	40	265	100,0	100,0	100,0	100,0
Totalt	232	180	76	488	—	—	—	—

Tabell 7. Fördelning på stadsdel, kön och yrkesställning

Kön Yrkesställning	»Stadsdelar»							
	Inre staden	Söder- ort	Väs- terort	Hela staden	Inre staden	Söder- ort	Väs- terort	Hela staden
	Antal				I procent			
<i>Män</i>								
Företagare.....	7	6	6	19	7,4	6,5	16,7	8,5
Förvaltningspersonal	45	43	20	108	47,4	46,7	55,5	48,4
Arbetare.....	37	41	10	88	38,9	44,6	27,8	39,5
Ej yrkesverksamma.....	6	2	—	8	6,3	2,2	—	3,6
Okänt.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	95	92	36	223	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Kvinnor</i>								
Företagare.....	7	2	2	11	5,1	2,3	5,0	4,1
Förvaltningspersonal	52	26	15	93	38,0	29,5	37,5	35,1
Arbetare.....	23	16	11	50	16,8	18,2	27,5	18,9
Ej yrkesverksamma.....	55	43	12	110	40,1	48,9	30,0	41,5
Okänt.....	—	1	—	1	—	1,1	—	0,4
Summa	137	88	40	265	100,0	100,0	100,0	100,0
Totalt	232	180	76	488	—	—	—	—

Redovisning av intervjustvaren

Subjektiva symtom och besvär

De frågor, som avser intervjustvarens subjektiva symtom och besvär, återfinnes på sidorna 3—8 i formuläret. I tab. 8 ges en översikt över förekomsten av sådana symtom med fördelning efter kön och ålder. Vissa av frågorna har dock redovisats mera summariskt, så t. ex. aptitlöshet, yrsel samt svimnings- och krampanfall. Svarsfrekvenserna har där ej medgivit någon ytterligare uppspaltning. I några fall har två eller flera frågor av likartat innehåll samkodats. Vid den följande redovisningen kommer därför frågorna att citeras ordagrant och en procentuell fördelning efter svarsalternativ att lämnas. Beträffande absoluta antal hänvisas till tab. 8, som anknyter till den följande framställningen.

Fråga 12. Lider Ni för närvarande av någon sjukdom eller invaliditet?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	68,2	69,0	68,6
Ja.....	31,8	31,0	31,4
Summa	100,0	100,0	100,0

Följande två frågor ställdes till dem, som svarade ja på fråga 12:

Fråga 13. Skulle Ni vilja ange sjukdomens (eller invaliditetens) art?

Fråga 14. Har Ni några smärtor?

Den första frågan, som var konstruerad som en öppen fråga, gav följande resultat:

Sjukdomens art	Sjuka och invalider i % av samtliga svarande		
	män	kvinnor	totalt
Kroppslig sjukdom.....	22,9	21,9	22,3
Invaliditet eller annan kroppslig defekt.....	4,0	2,3	3,1
Psyiskt besvär.....	0,9	2,6	1,9
Kroppsligt och psyiskt besvär..	3,6	3,4	3,5
Andra kombinationer.....	0,4	0,4	0,4
Tveksamhet om klassificeringen..	—	0,4	0,2
Summa sjuka och invalider	31,8	31,0	31,4

En viss uppfattning om besvärens betydelse utgör förekomsten av smärtor. Svaren blir här i hög grad beroende av psykologiska faktorer. Totalt var det endast 85 intervjupersoner eller 17,6 % av samtliga, som klagade över smärtor av något slag, dvs. något mer än hälften av alla, som redovisat sjukdomar eller defekter.

Frågorna 15 och 16 uteslöts från den statistiska bearbetningen, då de gav osäker information.

Fråga 17. Har Ni något besvär med sömnen?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	78,5	74,0	76,5
Ja.....	21,5	26,0	24,0
Summa	100,0	100,0	100,0

En specificering av sömnbesvärens art erhöles genom följande fråga, där ett antal tillämpliga alternativ skulle markeras:

Fråga 18:

1. Har Ni svårt att somna på kvällarna?
2. Brukar Ni ligga vaken flera timmar i följd under natten?
3. Brukar Ni vakna ett par timmar tidigare än Ni önskar?

(Annat besvär.) Har Ni några andra besvär med sömnen? (Öppen fråga.)

Svarsalternativ	Med sömnbesvär i % av samtliga intervjuade		
	män	kvinnor	totalt
1. Svårt att somna och ev. annat besvär.....	4,5	5,7	5,1
2. Brukar ligga vaken och ev. annat besvär.....	3,6	3,4	3,5
3. Brukar vakna och ev. annat besvär.....	3,6	1,9	2,7
1 + 2 och ev. annat besvär.....	2,2	3,8	3,1
1 + 3 » » » »	0,9	0,4	0,6
2 + 3 » » » »	2,2	4,1	3,3
1 + 2 + 3 och ev. annat besvär....	2,7	4,1	3,5
Annat besvär (enbart)	1,8	2,6	2,2
Summa »Med sömnbesvär«	21,5	26,0	24,0

Fråga 19, som är av annan karaktär, redovisas först efter genomgången av symtomfrågorna. Till de senare hör emellertid frågorna 20 och 21, som tar sikte på en redovisning av i vilken utsträckning trötthetskänslor och yttringar av trötthet förekommer.

Fråga 20. Brukar Ni lida av trötthetskänslor?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	54,7	41,9	47,7
Ja.....	45,3	58,1	52,3
Summa	100,0	100,0	100,0

Bland de intervjuade har kvinnor i högre grad än män uppgett sig lida av trötthetskänslor.

De, som svarade ja, fick ytterligare ange trötthetssymtomens yttringar i fråga 21, där följande alternativ presenterades:

1. Lider Ni av trötthet, innan Ni börjar dagens arbete?
2. Får Ni ibland en plötslig trötthet under arbetsdagens lopp?
3. Lider Ni av trötthet efter arbetsdagens slut?

(Annat sätt.) Lider Ni av trötthet på annat sätt (t. ex. på arbetsfria dagar)?

Svarsalternativ	Med trötthetskänslor i % av samtliga intervjuade		
	män	kvinnor	totalt
1. Trötthet före dagens arbete...	4,5	8,3	6,6
2. Ibland plötslig trötthet under dagen.....	9,0	12,4	10,9
3. Trötthet efter arbetsdagens slut	14,3	11,7	12,9
1 + 2 och ev. på annat sätt.....	1,3	5,7	3,7
1 + 3 » » » » »	1,8	5,3	3,7
2 + 3 » » » » »	6,3	5,3	5,7
1 + 2 + 3 och ev. på annat sätt ...	5,4	7,5	6,6
Trötthet på annat sätt (enbart) ..	2,7	1,9	2,2
Summa »Med trötthetskänslor«	45,3	48,1	52,3

Fråga 22. Känner Ni Er för närvarande nedstämd eller deprimerad?

De, som svarade ja på denna fråga, förelades följande alternativ i fråga 23:

Har något sorgligt inträffat, som förklarar detta?

Har Ni varit utsatt för någon annan form av psykisk press, som orsakar Er nedstämdhet?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	86,6	82,3	84,2
Ja.....	13,4	17,7	15,8
Därav sorglig händelse.....	3,1	5,3	4,3
Därav annan psykisk press....	8,5	9,0	8,8
Därav ingen angiven förklaring	1,8	3,4	2,7
Summa	100,0	100,0	100,0

Fråga 24. Har Ni tidigare haft någon period av nedstämdhet eller depression, då Ni känt Er tungsint, missmodig eller sorgsen?

Fråga 25 riktades enbart till dem, som svarat ja på föregående fråga, och upptog följande alternativ:

Har något sorgligt inträffat, som förklarade detta?

Var Ni utsatt för någon annan form av psykisk press, som orsakade Er nedstämdhet?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	57,4	55,5	56,3
Ja.....	42,6	44,5	43,7
Därav sorglig händelse.....	13,0	17,4	15,4
Därav annan psykisk press....	26,5	21,1	23,6
Därav utan angiven förklaring.	3,1	6,0	4,7
Summa	100,0	100,0	100,0

Fråga 26 liksom *fråga 29* har ej gjorts till föremål för bearbetningar, då svarens värde kan starkt ifrågasättas.

Fråga 27 bestod av alternativa formuleringar:

Blir Ni lätt irriterad av ljud och buller?

Blir Ni lätt irriterad av påfrestningar i arbetet?

Blir Ni lätt irriterad av påfrestningar i hemmet?

Är det något annat, som lätt gör Er så irriterad eller förargad, att det är plågsamt för Er?

Fråga 28. Tycker Ni själv, att Ni ofta blir så irriterad eller förargad, att det är plågsamt för Er?

En samkodning av frågorna har skett. Praktiskt taget alla de, som svarat ja (227 st.) på något av alternativen, stannade för det första alternativet, endast två för det andra alternativet, en för det tredje och en lämnade frågan obesvarad.

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	52,5	41,9	46,7
Ja (på något alternativ).....	47,5	58,1	53,3
Summa	100,0	100,0	100,0

Kvinnorna uppger oftare besvär (ca 10 % mer).

Fråga 30. Har Ni en benägenhet att bli ängslig eller orolig?

Fråga 31 omfattar ett antal alternativa formuleringar.

Får Ni ångestkänslor av motgångar och tråkigheter?

Får Ni ångest, då Ni fruktar att något obehagligt skall inträffa?
 Får Ni ångest utan att Ni själv vet varför?
 Intetdera.

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	63,7	50,9	56,8
Ja (på något alternativ)	36,3	49,1	43,2
Därav oro.....	29,1	35,8	32,8
» ångest.....	7,2	13,2	10,5
Summa	100,0	100,0	100,0

Kvinnorna uppger som synes större benägenhet för oro- och ångestsymtom.

Förekomsten av olika slag av tvångsföreställningar prövades genom frågorna 32—36, vilka för den skull samkodades.

Fråga 32. Brukar Ni kontrollera flera gånger, om Ni har stängt ytterdörren efter Er, släckt ljuset, stängt gaskranen eller dylikt?

Fråga 33. Brukar Ni känna Er rädd för höjder, t. ex. på en balkong högt upp, i ett utkikstorn eller på en takterrass?

Fråga 34. Är Ni så rädd för att gå ut ensam att Ni måste ha någon i sällskap?

Fråga 35. Har Ni en känsla av att Ni har eller kommer att få någon allvarlig sjukdom, utan att läkare ställt diagnos om någon sådan?

Fråga 36. Känner Ni obehag inför något annat, t. ex. att resa buss eller spårvagn, att sitta innerst i en bänk på bio, att gå över broar, torg etc.?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej (på alla frågor).....	52,9	38,5	45,1
Ja(på en eller flera frågor).....	47,1	61,5	54,9
Summa	100,0	100,0	100,0

Tvångssymtom är bland de intervjuade mer vanlig bland kvinnor än bland män. Detta gäller alla åldrar.

Fråga 37. Hur tycker Ni själv att Ert minne fungerar?

Denna fråga har inte gjorts till föremål för någon mera omfattande bearbetning. Man kan här tänka sig någon sorts skalteknik. De egna omdomena är ganska litet värda, då de inte kan sättas i relation till någon eller några frågor eller yttre faktorer av kontrollkaraktär. Här skall därför blott anges svarsfördelningen.

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %
Bra.....	44,3
Ganska bra.....	41,0
Mindre bra.....	10,1
Dåligt.....	4,6
Summa	100,0

De följande frågorna 39—42 gav starkt sneda svarsfördelningar och har därför icke gjorts till föremål för mera omfattande uppspaltningar. De ger visserligen värdefull information för bedömningen av de enskilda fallen, men det är ju här fråga om relativt ovanliga symtom (i ett tvärsnitt av befolkningen).

Fråga 39. Har Ni haft några krampanfall med medvetslöshet?

Fråga 40. När fick Ni senast ett sådant krampanfall?

Fråga 41. Har Ni haft några andra svimningsanfall?

Fråga 42. När svimmade Ni sist?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %	
	Krampanfall	Svimningsanfall
Nej.....	97,5	84,8
Ja.....	2,5	15,2
Därav efter 1/1 1955.....	0,6	4,5
» före 1/1 1955.....	1,8	10,2
» utan tidsangivelse.....	—	0,4
Summa	100,0	100,0

Fråga 43. Besväras Ni av huvudvärk. Om ja. Hur ofta?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	73,5	57,0	64,6
Ja.....	26,5	43,0	35,4
Därav dagligen.....	2,7	4,9	3,9
» någon eller några ggr i veckan.....	7,6	9,4	8,6
» mera sällan.....	15,7	28,3	22,5
» tid ej specificerad.....	0,5	0,4	0,4
Summa	100,0	100,0	100,0

De intervjuade kvinnorna uppvisar också här större frekvens med besvär än männen och det gäller alla åldrar, fastän naturligtvis exceptionellt starkt i åldrarna under 50 år (menstruationsbesvär). Till kvinnliga intervju personer födda 1907 och senare ställdes därför följande fråga:

Fråga 44. Förvärras Er huvudvärk påtagligt vid menstruationen?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %	
	20—34 år	35—49 år
Nej.....	82,5	64,4
Ja.....	17,5	35,6
Summa	100,0	100,0

Om man bortser från sådana fall, där huvudvärken möjligen kan betraktas som ett menstruationsbesvär, erhåller man följande serie procenttal:

	Procentuell andel med huvudvärk inom åldrarna				
	20—34 år	35—49 år	50—64 år	65—w år	Alla åldrar
Män.....	24,6	25,8	29,2	28,0	26,5
Kvinnor.....	20,0	24,7	37,0	33,0	27,3

Jämfört med motsvarande procenttal i tab. 8 konstateras, att skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om förekomst av huvudvärk på detta sätt reducerats.

Fråga 45. Lider Ni av anfallsvis påkommande huvudvärk, d. v. s. vad man kallar migrän?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	20,2	31,3	26,2
Ja.....	4,0	10,6	7,6
Frågan ej besvarad.....	2,2	1,1	1,6
Frågan ej aktuell (Nej på fråga 43)	73,6	57,0	64,6
Summa	100,0	100,0	100,0

Migrän förekom sålunda relativt sällan och var bland de intervjuade vanligast hos kvinnorna, där ungefär var tionde uppgav sig lida därav. En bearbetning gjordes dock även åldersvis och finnes redovisad bland symptomen i tab. 8.

Samtliga, som svarat ja på frågan 43, förelades även ett antal frågor rörande olika former av huvudvärk.

Fråga 46. Brukar

det kännas som ett band över pannan eller hjässan?

det kännas som ett tryck över eller i huvudet?

huvudvärken sitta i ena halvan av huvudet?

huvudvärken yttra sig på något annat sätt? Hur?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
1. Som ett band över pannan eller hjässan.....	10,8	18,5	15,0
2. Som ett tryck över eller i huvudet.....	4,9	4,1	4,5
3. I ena halvan av huvudet....	1,8	5,7	3,9
Kombinationer av 1, 2 o. 3.....	—	3,0	1,6
På annat sätt.....	7,2	10,2	8,8
Uppgift saknas om sättet.....	1,8	1,5	1,6
Ej aktuell (Nej på fråga 43)	73,5	57,0	64,6
Summa	100,0	100,0	100,0

För svarsalternativ 1) kan det på grund av den höga frekvensen vara motiverat att jämföra förekomsten i olika åldrar.

	Procentuell andel med ifrågavarande besvär inom åldrarna				
	20—34 år	35—49 år	50—64 år	65—w år	Alla åldrar
Män.....	8,2	14,6	8,3	8,0	10,8
Kvinnor.....	11,3	35,6	13,7	10,3	18,5

Skillnaderna mellan åldersklasserna uttryckta i absoluta tal är givetvis små, men ovanstående relativtal utvisar både för män och kvinnor en viss anhopning till åldersgruppen 35—49 år.

Fråga 47. Har Ni lätt för att få yrsel?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	91,5	77,0	83,6
Ja.....	8,5	23,0	16,4
Summa	100,0	100,0	100,0

Beträffande tidpunkten för senaste anfall (*fråga 48*) må här endast anföras, att 62 fall (12,7 %) haft dylika anfall efter den 1 januari 1955, medan endast 11 fall (2,3 %) haft sådana tidigare. För 7 fall (1,4 %) saknades tidsangivelse.

Även när det gäller yrsel ligger siffrorna högre för kvinnor än för män.

Fråga 49. Har Ni på sista tiden lidit av aptitlöshet?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	94,1	93,6	93,8
Ja.....	5,9	6,4	6,2
Summa	100,0	100,0	100,0

Frågor av denna typ är givetvis berättigade som ett bidrag till bedömningen av intervjupersonernas hälsotillstånd.

Isolerade ger frågorna ganska litet.

De följande tre frågorna, som avsåg att belysa förekomsten av känslor av osäkerhet och otillräcklighet, har samkodats.

Fråga 50. Känner Ni Er ofta osäker på Er själv eller besvärad i andra människors sällskap?

Fråga 51. Har Ni en benägenhet att ta saker och ting hårt?

Fråga 53. Har Ni svårt att hålla ut med en besvärlig arbetsuppgift?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej (på alla frågor) . . .	58,7	52,1	55,1
Ja (på minst en fråga) .	41,3	47,9	44,9
Summa	100,0	100,0	100,0

Även här redovisar de intervjuade kvinnorna mera besvär. Av åldersfördelningen i tab. 8 framgår, att dessa besvär främst är för handen i de yngre åldrarna.

Fråga 52. Känner Ni Er misstrodd eller missförstådd i livet?

Denna fråga gav en extremt sned svarsfördelning. Ja-svaren utgjorde 5,5 % och Nej-svaren 94,5 %.

Fråga 54. Har Ni i övrigt något besvär eller symptom, som inte framgått av föregående frågor?

Som framgår av formuleringen avsåg denna fråga närmast att fånga upp sådana eventuella informationer, som kunde ha relevans för bedömning av intervjupersonerna. Även här erhöles en sned svarsfördelning, i det att 85,0 % svarade Nej och 15,0 % svarade Ja.

Sömn och sömngående

Fråga 19 a) Hur många timmar sover Ni i allmänhet per dygn?

Fråga 19 b) När brukar Ni gå till sängs?

Svarsfördelningen efter a) framgår av tab. 9. Tabellen visar, att det råder stora individuella variationer. Detta framgår även av tab. 10, där a) och b) satts i samband med varandra. Man konstaterar genast, att även beträffande klockslaget för sömngående råder stor variation. Fördelningarna för a) och b) är båda symmetriska. En viss antydning till samvariation finnes i tab. 10. De, som går och lägger sig tidigare, sover också i allmänhet fler timmar per dygn.

Analogt med vad som skedde under a) har svaren under b) redovisats med fördelning efter kön och ålder.

Tabell 8. Översikt angående förekomsten av vissa symtom och besvär inom olika kön och åldersgrupper

Symtom	Män					Kvinnor					Män och kv.
	Åldersgrupper (år)										
	20— 34	35— 49	50— 64	65— w	S:a	20— 34	35— 49	50— 64	65— w	S:a	
Antal.	61	89	48	25	223	80	73	73	39	265	488
Därav:											
Sjukd. el. invaliditet.	12	28	17	14	71	13	12	39	18	82	153
Sömnrubbing.	11	22	9	6	48	11	14	26	18	69	117
Trötthet.	32	39	21	9	101	49	46	38	21	154	255
Aktuell depression. .	6	9	10	5	30	9	19	11	8	47	77
Tidigare depression. .	26	37	22	10	95	37	34	34	13	118	213
Irritation.	30	42	24	10	106	48	49	41	16	154	260
Oro.	22	25	13	5	65	40	26	19	10	95	160
Ängest.	8	3	4	1	16	7	10	13	5	35	51
Tvångssymtom.	30	47	19	9	105	54	52	35	22	163	268
Huvudvärk.	15	23	14	7	59	30	44	27	13	114	173
varav i samband med mens.	—	—	—	—	—	14	26	—	—	40	40
Migrän.	1	6	2	—	9	8	13	6	1	28	37
Osäkerhet m. m.	33	34	17	8	92	45	43	25	14	127	219
Proc. fördelningar											
Därav:											
Sjukd. el. invaliditet.	19,7	31,5	35,4	56,0	31,8	16,3	16,4	53,4	46,2	30,0	31,4
Sömnrubbing.	18,0	24,7	18,8	24,0	21,5	13,8	19,2	35,6	46,2	26,0	24,0
Trötthet.	52,5	43,8	43,8	36,0	45,3	61,3	63,0	52,1	53,8	58,1	52,3
Aktuell depression. .	9,8	10,1	20,8	20,0	13,5	11,3	26,0	15,1	20,5	17,7	15,8
Tidigare depression. .	42,6	41,6	45,8	40,0	42,6	46,3	46,6	46,6	33,3	44,5	43,6
Irritation.	49,2	47,2	50,0	40,0	47,5	60,0	67,1	56,2	41,0	58,1	53,3
Oro.	36,1	28,1	27,1	20,0	29,1	50,0	35,6	26,0	25,6	35,8	32,8
Ängest.	13,1	3,4	8,3	4,0	7,2	8,8	13,7	17,8	12,8	13,2	10,5
Tvångssymtom.	49,2	52,8	39,6	36,0	47,1	67,5	71,2	47,9	56,4	61,5	54,9
Huvudvärk.	24,6	25,8	29,2	28,0	26,5	37,5	60,3	37,0	33,3	43,0	35,5
varav i samband med mens.	—	—	—	—	—	17,5	35,6	—	—	15,1	8,2
Migrän.	1,6	6,7	4,2	—	4,0	10,0	17,8	8,2	2,6	10,6	7,6
Osäkerhet m. m.	54,1	38,2	35,4	32,0	41,3	56,3	58,9	34,2	35,9	47,9	44,9
Därav:											
Sjukd. el. invaliditet.	16,9	39,4	24,0	19,7	100	15,9	14,6	47,6	21,9	100,0	
Sömnrubbing.	22,9	45,8	18,8	12,5	100	15,9	20,3	37,7	26,1	100,0	
Trötthet.	31,7	38,6	20,8	8,9	100	31,8	29,9	24,7	13,6	100,0	
Aktuell depression. .	20,0	30,0	33,3	16,7	100	19,2	40,4	23,4	17,0	100,0	
Tidigare depression. .	27,4	38,9	23,2	10,5	100	31,4	28,8	28,8	11,0	100,0	
Irritation.	28,3	39,6	22,7	9,4	100	31,2	31,8	26,6	10,4	100,0	
Oro.	33,8	38,5	20,0	7,7	100	42,1	27,4	20,0	10,5	100,0	
Ängest.	50,0	18,8	25,0	6,2	100	20,0	28,6	37,1	14,3	100,0	
Tvångssymtom.	28,6	44,8	18,1	8,5	100	33,1	31,9	21,5	13,5	100,0	
Huvudvärk.	25,4	39,0	23,7	11,9	100	26,3	38,6	23,7	11,4	100,0	
varav i samband m. mens.	—	—	—	—	—	35,0	65,0	—	—	100,0	
Migrän.	11,1	66,7	22,2	—	100	28,6	46,4	21,4	3,6	100,0	
Osäkerhet m. m.	35,9	36,9	18,5	8,7	100	35,4	33,9	19,7	11,0	100,0	

Nedanstående tablå visar sömn per dygn i kombination med förekomsten av trötthetskänslor (procentuell fördelning).

Besväras Ni av trötthetskänslor?	Sömn, antal timmar per dygn					
	—5	6	7	8	9—	I allt
Nej.....	32,5	38,0	48,0	53,4	55,3	47,7
Ja.....	67,5	62,0	52,0	46,6	44,7	52,3
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Följande tablå visar sömnbesvär i kombination med sömn per dygn (procentuell fördelning).

Har Ni sömnbesvär?	Sömn, antal timmar per dygn					
	—5	6	7	8	9—	I allt
Nej.....	27,5	56,9	82,2	88,3	91,5	76,0
Ja.....	72,5	43,1	17,8	11,7	8,5	24,0
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sömn per dygn har också satts i relation till förekomsten av kroppslig sjukdom eller invaliditet. Man återfinner naturligt nog kortare nattsömn hos de intervjupersoner, som uppger sig lida av någon kroppslig sjukdom eller ha någon defekt. Relativtalen i denna tablå illustrerar detta förhållande:

Lider Ni av kroppslig sjukdom eller invaliditet?	Sömn, antal timmar per dygn					
	—5	6	7	8	9—	I allt
Nej.....	45,0	58,2	78,3	71,8	70,2	68,6
Ja.....	55,0	41,8	21,7	28,2	29,8	31,4
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Symtomens varaktighet och svårhetsgrad

Genom att ställa frågorna 55—58 ville man i någon mån komplettera de egna uppgifterna om olika symtom och besvär. Som framgår av anvisningen före fråga 55 i formuläret, skulle frågorna 55—58 ställas endast till sådana intervjupersoner, som anser sig själva lida av något slags besvär. Frågan skulle ställas även i tveksamma fall. Tyvärr är anvisningen alltför vag. Intervjuaren kan inte i praktiken hålla i minnet alla tidigare svar och intervjupersonen kan visserligen ha angett några speciella besvär men inte ansett detta värt att närmare utveckla. Det framgår i andra sammanhang, att ytterst få personer helt saknar besvär eller symtom medan

Tabell 9. Sömn antal timmar per dygn med fördelning efter kön och ålder

Kön Ålder		Sömn per dygn									
		Antal timmar								Summa	
		—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—		Uppg. saknas
<i>Antal</i>											
<i>Män</i>											
20—34 år		—	2	6	28	19	5	—	—	1	61
35—49 »		3	6	10	29	32	5	1	1	2	89
50—64 »		1	3	7	22	11	3	—	—	1	48
65—w »		2	1	6	3	9	1	1	1	1	25
Summa		6	12	29	82	71	14	2	2	5	223
<i>Kvinnor</i>											
20—34 år		2	2	13	21	34	6	2	—	—	80
35—49 »		—	2	8	26	24	8	4	1	—	73
50—64 »		2	7	20	14	24	2	3	—	1	73
65—w »		4	3	9	9	10	3	—	—	1	39
Summa		8	14	50	70	92	19	9	1	2	265
Totalt		14	26	79	152	163	33	11	3	7	488
<i>Fördelning i %</i>											
<i>Män</i>											
20—34 år		—	3,3	9,8	45,9	31,2	8,2	—	—	1,6	100
35—49 »		3,4	6,7	11,2	32,6	36,0	5,6	1,1	1,1	2,3	100
50—64 »		2,1	6,3	14,6	45,8	22,9	6,2	—	—	2,1	100
65—w »		8,0	4,0	24,0	12,0	36,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100
Summa		2,7	5,4	13,0	36,8	31,8	6,3	0,9	0,9	2,2	100
<i>Kvinnor</i>											
20—34 år		2,5	2,5	16,2	26,3	42,5	7,5	2,5	—	—	100
35—49 »		—	2,7	11,0	35,6	32,9	10,9	5,5	1,4	—	100
50—64 »		2,7	9,6	27,4	19,2	32,9	2,7	4,1	—	1,4	100
65—w »		10,2	7,7	23,1	23,1	25,6	7,7	—	—	2,6	100
Summa		3,0	5,3	18,9	26,4	34,7	7,2	3,4	0,4	0,7	100
Totalt		2,9	5,3	16,2	31,1	33,4	6,8	2,3	0,6	1,4	100

Tabell 10. Sömn per dygn och tid för sänggående

Sömn per dygn		Sänggående							Summa	
		Tidpunkt, klockan								
		—20.00	20.00— 21.00	21.00— 22.00	22.00— 23.00	23.00— 24.00	0.00—	Varie- rande		Uppg. saknas
<i>Antal</i>										
— 5 timmar		—	2	5	2	4	—	1	—	14
5— 6 »		—	—	6	10	6	3	1	—	26
6— 7 »		—	4	8	34	23	10	—	—	79
7— 8 »		1	6	17	76	43	4	5	—	152
8— 9 »		3	10	41	75	23	2	8	1	163
9—10 »		1	6	12	11	2	1	—	—	33
10—11 »		1	6	2	1	—	—	1	—	11
11— »		—	1	1	—	—	—	1	—	3
Uppgift saknas		—	1	2	2	—	—	2	—	7
Summa		6	36	94	211	101	20	19	1	488
<i>Fördelning i %</i>										
— 5 timmar		—	14,3	35,7	14,3	28,6	—	7,1	—	100
5— 6 »		—	—	23,1	38,5	23,1	11,5	3,8	—	100
6— 7 »		—	5,1	10,1	43,0	29,1	12,7	—	—	100
7— 8 »		0,7	3,9	11,2	50,0	28,3	2,6	3,3	—	100
8— 9 »		1,9	6,1	25,2	46,0	14,1	1,2	4,9	0,6	100
9—10 »		3,0	18,2	36,4	33,3	6,1	3,0	—	—	100
10—11 »		9,1	54,5	18,2	9,1	—	—	9,1	—	100
11— »		—	33,3	33,3	—	—	—	33,4	—	100
Uppgift saknas		—	14,2	28,6	28,6	—	—	28,6	—	100
Summa		1,2	7,4	19,3	43,2	20,7	4,1	3,9	0,2	100

Tabell 11. Tidpunkt för sänggående med fördelning efter kön och ålder

Kön Ålder	Sänggående								Summa
	Tidpunkt, klockan								
	—20.00	20.00— 21.00	21.00— 22.00	22.00— 23.00	23.00— 24.00	0.00—	Varie- rande	Uppg. saknas	
<i>Antal</i>									
<i>Män</i>									
20—34 år.....	—	1	6	28	18	4	3	1	61
35—49 ».....	1	10	20	31	18	2	7	—	89
50—64 ».....	1	1	9	28	8	—	1	—	48
65—w ».....	—	2	6	10	3	3	1	—	25
Summa	2	14	41	97	47	9	12	1	223
<i>Kvinnor</i>									
20—34 år.....	—	1	9	44	24	—	2	—	80
35—49 ».....	1	6	18	30	15	2	1	—	73
50—64 ».....	2	7	15	28	11	9	1	—	73
65—w ».....	1	8	11	12	4	—	3	—	39
Summa	4	22	53	114	54	11	7	—	265
Totalt	6	36	94	211	101	20	19	1	488
<i>Fördelning i %</i>									
<i>Män</i>									
20—34 år.....	—	1,6	9,9	45,9	29,5	6,6	4,9	1,6	100
35—49 ».....	1,1	11,2	22,5	34,8	20,2	2,3	7,9	—	100
50—64 ».....	2,1	2,1	18,7	58,3	16,7	—	2,1	—	100
65—w ».....	—	8,0	24,0	40,0	12,0	12,0	4,0	—	100
Summa	0,9	6,3	18,4	43,5	21,1	4,0	5,4	0,4	100
<i>Kvinnor</i>									
20—34 år.....	—	1,2	11,3	55,0	30,0	—	2,5	—	100
35—49 ».....	1,4	8,2	24,7	41,1	20,5	2,7	1,4	—	100
50—64 ».....	2,7	9,6	20,5	38,4	15,1	12,3	1,4	—	100
65—w ».....	2,6	20,5	28,2	30,8	10,2	—	7,7	—	100
Summa	1,5	8,3	20,0	43,0	20,4	4,2	2,6	—	100
Totalt	1,2	7,4	19,3	43,2	20,7	4,1	3,9	0,2	100

å andra sidan endast ca 12 % anser sig vara i behov av hjälp för nervösa besvär. Här föreligger alltså en stor spännvidd. Tydligen har i frågorna 55—58 ca hälften av de intervjuade tillfrågats. Uppenbarligen anser dock majoriteten av dem, som besvarat dessa frågor, att något hjälpbehov icke föreligger.

Fråga 55. Hur länge har Ni haft de här besvären, som Ni berättat om i denna intervju?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Kortare tid än 1 månad.....	0,5	—	0,2
Minst en månad, men mindre än ½ år.....	2,2	1,9	2,1
Minst ½ år, men mindre än 1 år.....	0,9	2,7	1,8
Minst 1 år.....	47,1	46,0	46,5
Frågan ej aktuell.....	49,3	49,4	49,4
Summa	100,0	100,0	100,0

För det övervägande flertalet med dessa besvär gäller sålunda, att de har haft dem under en längre tid. I själva verket är det endast ett fåtal som haft besvären kortare tid än 1 år.

Ställer man förekomsten av besvär i relation till ålder, får man följande tablå:

	Procentuell andel med symptom inom åldrarna				
	20—34 år	35—49 år	50—64 år	65—w år	Alla åldrar
Män.....	52,4	44,9	58,4	52,0	50,7
Kvinnor.....	46,3	53,4	54,8	46,2	50,6

Till kvinnliga intervjupersoner födda 1907 eller senare (20—49 år) riktades följande fråga.

Fråga 56. Påverkar menstruationen de här besvären?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %
Nej.....	28,8
Ja.....	20,3
varav besvären uppträder endast i samband härmed.....	5,2
varav besvären förvärras i samband härmed.....	15,0
Frågan ej aktuell.....	49,6
Uppgift saknas.....	1,3
Summa	100,0

Fråga 57. Anser Ni att de här besvären sammanhänger med övergångs-åldern? Frågan som endast ställdes till kvinnor födda mellan åren 1900—1915, har också bearbetats, men då den i undersökningen använda åldersgrupperingen ej medger att siffrorna ställas i relation till antalet intervjuade kvinnor i dessa åldrar, får vi här nöja oss med att sätta dem i relation till totala antalet kvinnor i undersökningen.

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %
Nej.....	8,7
Ja.....	6,4
Frågan ej aktuell.....	84,9
Summa	100,0

Fråga 58 upptog ett antal svarsalternativ.

Har symtomen

varit så obetydliga, att Ni inte brytt Er om dem i vanliga fall?

varit tämligen besvärande?

varit så svåra, att Ni knappast kunnat klara Ert dagliga arbete?

varit så svåra, att Ni inte alls kunnat arbeta?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Obetydliga besvär	20,6	17,0	18,6
Tämligen besvärande.....	18,9	18,5	18,7
Svåra.....	3,6	7,5	5,7
Ur stånd att arbeta.....	6,7	6,8	6,8
Frågan ej aktuell.....	49,3	49,4	49,4
Uppgift saknas.....	0,9	0,8	0,8
Summa	100,0	100,0	100,0

Medicinförbrukning och tidigare sökt hjälp

Frågorna 59—71 avsåg att ge en kortfattad redovisning av de intervjuades medicinförbrukning (för nervösa besvär) samt omfattningen och arten av den hjälp, som vederbörande i förekommande fall sökt och erhållit.

Fråga 59. Har Ni under de senaste åren använt medicin (t. ex. tabletter)?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej.....	43,5	26,8	34,4
Ja.....	56,5	73,2	65,6
Därav mer tillfälligt .	41,3	47,6	44,7
» regelbundet			
under längre tid.....	15,2	25,6	20,9
Summa	100,0	100,0	100,0

De intervjuade kvinnorna redovisar större benägenhet att använda medicin. Detta gäller både regelbunden och mera sporadisk användning.

Svarsfördelningen på denna fråga överensstämmer med den tidigare redovisningen av besvär.

Nedanstående tablå visar användning av medicin med fördelning på åldersgrupper.

Svarsalternativ	Svarsfördelning i % inom åldrarna			
	20—34 år	35—49 år	50—64 år	65—w år
Nej.....	34,7	38,9	32,3	20,9
Ja, tillfälligt.....	51,1	43,8	39,7	44,6
Ja, regelbundet.....	14,2	17,3	28,1	34,4
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0

Fråga 60. Har Ni

blivit ordinerad medicin av läkare?

själv köpt medicin utan läkarrecept?

Svarsalternativ	Svar i %
Ordinerad av läkare.....	44,6
Köpt utan recept.....	11,9
Båda delarna.....	9,0
Frågan ej aktuell.....	34,6
Summa	100,0

Anteckningarna till frågorna 59 och 60 gav en del upplysningar om vilka slags preparat, som kommit till användning. Huvudvärks- och sömnmedel hade förbrukats av 13,7 %, vitaminpreparat m. m. av 19,1 %. För resten av de medicinförbrukande eller 32,8 % kunde dock ej slaget av medicin närmare angivas.

Fråga 61. Har Ni missbrukat eller överdoserat medicin?

Denna fråga ställdes till personer, som köpt medicin utan recept, d. v. s. 102 fall. I endast 2 fall medgavs missbruk. Frågan gäller ett ömtåligt ämne och svaren måste betraktas som mycket osäkra.

Fråga 62. Har det någonsin inträffat, att Ni sökt läkare för kroppsligt lidande, men att läkaren inte kunnat finna något fel på Er?

Svarsalternativ	Svar i %
Nej.....	85,8
Ja.....	14,2
Därav efter 1/1 1955.....	6,6
» före 1/1 1955.....	7,6
Summa	100,0

Närmast följande frågor tar sikte på att kartlägga den hjälp, som vederbörande sökt för sina nervösa åkommor. En utförlig redovisning av den sökta hjälpen, dess art och tiden för densamma lämnas i *tab. 12*. Då denna tabell innehåller såväl antal som procenttal, kommer vid den följande genomgången av dessa frågor endast vissa siffror att omnämnas.

Fråga 63. Har Ni någonsin sökt läkare för nervösa besvär?

Fråga 64. Har Ni någonsin vårdats på sjukhus för nervösa besvär?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %		
	män	kvinnor	totalt
Nej (på båda frågorna).....	77,6	67,9	72,3
Ja (på båda eller endera).....	22,4	32,1	27,7
Summa	100,0	100,0	100,0

På samma sätt som beträffande olika besvär överväger kvinnorna bland de intervjuade. Beträffande uppdelning på vårdform har flertalet endast sökt läkare; 24,6 % av samtliga mot endast 3,1 %, som vårdats på sjukhus.

Följande tablå redovisar andelen intervjupersoner, som sökt hjälp för nervösa besvär i procent inom resp. åldersgrupper:

	20—34 år	35—49 år	50—64 år	65—w år
Män.....	26,2	24,6	18,7	26,0
Kvinnor.....	25,0	39,7	27,0	23,1

Nedanstående tablå visar »sökt hjälp» med fördelning på kön och civilstånd:

Sökt hjälp	Män		Kvinnor	
	Gifta	Ej gifta	Gifta	Ej gifta
Totalantal.....	154	69	157	108
Därav i %				
Nej.....	76,0	81,2	62,4	84,6
Ja.....	24,0	18,8	37,6	15,4
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0

Särskilt de gifta kvinnorna har ofta sökt hjälp tidigare. Följande procenttal illustrerar ytterligare detta förhållande:

	Procentuell andel med »sökt hjälp» inom åldrarna			
	20—34 år	35—49 år	50—64 år	65—w år
Gifta män.....	33,3	23,9	21,1	16,7
Gifta kvinnor.....	26,0	45,6	40,5	38,5
Ogifta kvinnor.....	23,3	18,7	33,3	15,4

Nedan redovisas »sökt hjälp» med fördelning på kön och förekomst av förvärvsarbete:

	Män		Kvinnor	
	Förvärvs- arbetande	Ej för- värvs- arbetande	Förvärvs- arbetande	Ej för- värvs- arbetande
Totalantal.....	195	28	129	136
Därav i %				
Nej.....	76,9	82,1	77,5	58,8
Ja.....	23,1	17,9	22,5	41,2
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0

Förekomst av förvärvsarbete i kombination med kön och åldersgrupper gav följande utfall:

	Procentuell andel med »sökt hjälp» inom åldrarna		
	20—34 år	35—49 år	50—65 år
Förvärvsarbetande män.....	25,9	24,7	17,8
» kvinnor.....	17,8	26,2	27,3
Ej förvärvsarbetande kvinnor...	34,3	38,1	45,0

Den högsta åldersgruppen har uteslutits ur jämförelsen, då den har få förvärvsarbetande.

De båda följande frågorna ställdes enbart i de fall, där intervjupersonen svarat ja på fråga 63 eller 64:

Fråga 66. Var den (de) läkare, som Ni då konsulterade

provinsialläkare, distriktsläkare eller annan läkare som inte är nerv-specialist?

privatpraktiserande nervspecialist?

läkare på psykiatrisk mottagning eller psykiatrisk poliklinik på sjukhus?

läkare på annan mottagning eller poliklinik på sjukhus?

annat?

För denna liksom för de följande frågorna i detta avsnitt har någon uppdelning på kön och åldrar inte företagits. Svarsfrekvenserna är i flertalet fall alltför små. Däremot har genomgående i *tab. 12* lämnats en uppdelning efter erhållen vård. Antalet, som vårdats på sjukhus, är visserligen litet — endast 15 personer — men en redovisning har ansetts motiverad.

Av intervjupersoner, som blott sökt läkare för sina nervösa besvär, har tydligen mer än hälften nöjt sig med att söka en icke-specialist. För dem, som fått sjukhusvård, är givetvis förhållandet ett annat. Av samtliga

intervjuade har ungefär var tionde någon gång sökt en specialist, antingen en privatpraktiserande läkare eller på en psykiatrisk mottagning vid sjukhus.

Fråga 67. Har Ni sedan den 1/1 1955 vårdats på sjukhus (ev. utöver vad som tidigare nämnts)?

Fråga 68. Har Ni sedan den 1/1 1955 vistats på vilohem eller liknande?

Tab. 12 ger också här en översikt över ifrågavarande svarsfrekvenser (i kombination med frågorna 63—64). Man bör lägga märke till att det ej enbart är fråga om nervösa besvär, utan om överhuvudtaget alla slags åkommor. Som synes är det ungefär en sjättedel av samtliga undersökta, vilka vårdats på sjukhus eller vilohem under en tidrymd av mindre än halvannat år.

Fråga 69. Har Ni sedan den 1/1 1955

sökt hjälp på rådgivningsbyrå?

sökt hjälp genom kurator?

vänt Er till homeopat eller kiropraktiker?

Intet av detta.

Enligt tab. 12 hade mycket få anlitat dessa hjälpformer. Det kan naturligtvis vara så att sociala värderingar kan ha spelat en roll för svaren. Därom kan dock intet sägas med visshet. På dessa grunder har därför fråga 70 ej bearbetats.

Beträffande fråga 71: »Har Ni sökt annan hjälp för nervösa besvär än vad som tidigare nämnts?» kan noteras, att vid genomgången av densamma erhöles inte ett enda ja-svar.

Behov av hjälp för nervösa symtom

Frågeformulärets avsnitt ägnades åt de intervjuades egna synpunkter på behovet av olika slags hjälp för nervösa besvär.

Fråga 72. Anser Ni själv, att Ni för närvarande behöver söka hjälp i någon form för nervösa besvär?

Svarsalternativ	Svarsfördelning i %
Nej.....	87,5
Ja.....	5,1
Tveksam.....	4,7
Erhåller för närvarande läkarvård.....	2,7
Summa	100,0

De tre senare svarsalternativen har sammanförts till en grupp. Det har bedömts rimligt att förfara så, då även de tveksamma i allmänhet torde få anses som benägna för att söka hjälp. Totalt erhöles sålunda 12,5 % i behov av hjälp. Fördelningen efter ålder och kön framgår av tab. 13, där samtidigt det aktuella hjälpbehovet satts i samband med tidigare sökt hjälp.

Tabell 12. Fördelning efter läkarbesök och sjukvård för nervösa besvär samt tidpunkt för vård, sökt hjälp m. m.

Vård, sökt hjälp m. m.	Läkarbesök och sjukvård för nervösa besvär							
	Antal personer				I procent			
	Har ej sökt läkare eller sjukvård	Har sökt läkare	Har vårdats på sjukhus	Summa	Har ej sökt läkare eller sjukvård	Har sökt läkare	Har vårdats på sjukhus	Summa
<i>Tidpunkt</i>								
Sökt efter 1/1 1955....	—	44	5	49	—	36,7	33,3	10,1
» före 1/1 1955.....	—	76	10	86	—	63,3	66,7	17,6
Ej aktuellt.....	353	—	—	353	100,0	—	—	72,3
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Konsulterat läkare</i>								
Prov. läk., distr.läk. ...	—	44	1	45	—	36,7	6,7	9,2
Priv.prakt. nervspec....	—	31	5	36	—	25,8	33,3	7,4
Läk. på psyk. mottagn. eller poliklinik.....	—	8	5	13	—	6,7	33,3	2,7
Läk. på annan mottagn. eller poliklinik.....	—	24	4	28	—	20,0	26,7	5,7
Annan.....	—	9	—	9	—	7,5	—	1,9
Uppgift saknas.....	—	4	—	4	—	3,3	—	0,8
Ej aktuellt.....	353	—	—	353	100,0	—	—	72,3
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Vård på sjukhus o. d. efter 1/1 1955</i>								
På sjukhus.....	47	19	1	67	13,3	15,8	6,7	13,7
» vilohem eller likn. ...	4	4	5	13	1,1	3,3	33,3	2,7
Bådadera.....	3	2	—	5	0,9	1,7	—	1,0
Uppgift saknas.....	—	1	—	1	—	0,9	—	0,2
Ej aktuellt.....	299	94	9	402	84,7	78,3	60,0	82,4
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Annan sökt hjälp efter 1/1 1955</i>								
Rådgivningsbyrå.....	3	2	—	5	0,8	1,7	—	1,0
Kurator.....	9	2	1	12	2,6	1,7	6,7	2,5
Homeopat el. kiroprakt.	6	2	1	9	1,7	1,7	6,7	1,8
Ej aktuellt.....	335	114	13	462	94,9	95,0	86,7	94,7
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0

Följande tablå beskriver fördelningen på kön och yrkesställning bland dem, som anser sig behöva hjälp.

Behov av hjälp	Män		Kvinnor	
	med yrkesställning	utan yrkesställning	med yrkesställning	utan yrkesställning
Totalantal.....	215	8	154	110
Därav i %				
Nej.....	87,9		91,6	80,0
Ja.....	12,1		8,4	20,0
Summa	100,0		100,0	100,0

De följande frågorna 73—77 ställdes endast till personer, som svarade ja eller ställde sig tveksamma till fråga 72. Svarsfördelningarna redovisas här i form av en översiktstabell, varvid genomgående korstabulerats mot »tidigare vård för nervösa besvär» (frågorna 63—64). Se tab. 14.

Fråga 73. Föredrar Ni i så fall att vända Er till en privatpraktiserande läkare, som icke är psykiater eller nervspecialist?

privatpraktiserande psykiater eller nervspecialist?

läkare på psykiatrisk mottagning eller psykiatrisk poliklinik på sjukhus?

läkare på annan mottagning eller annan poliklinik på sjukhus?

annan person eller institution?

ingen bestämd uppfattning.

Preferenserna var större för privatpraktiker än för mottagningar och polikliniker på sjukhus.

Fråga 74. Har Ni behov att få kontakt med en kurator?

Fråga 75. Har Ni behov att få kontakt med en rådgivningsbyrå?

Dessa hjälpformer har i anmärkningsvärd liten utsträckning kommit i åtanke och de val, som därvid gjorts, kommer alla från sådana personer, som tidigare sökt vård för nervösa besvär.

Fråga 76. Tror Ni Er behöva vård på sjukhus eller vistelse på vilohem?

En enda ansåg sig i behov av sjukhusvård och ytterligare en önskade både sjukhusvård och vistelse på vilohem. Sex personer ville enbart till vilohem.

Fråga 77. Har Ni eljest några synpunkter på den hjälp, som Ni skulle behöva för Edra nervösa besvär?

Ungefär hälften av de hjälpbehövande eller ca 5 % av samtliga intervjuade anförde ytterligare synpunkter på sitt hjälpbehov. Med denna fråga avslutades det egentliga frågeformuläret; vad som kom därefter tog sikte på själva intervjun och intervjusituationen och utgjordes i huvudsak av intervjuarens observationer.

Tabell 13. Fördelning efter tidigare sökt hjälp och aktuellt behov av hjälp

Kön Ålder	Har sökt hjälp tidigare			Har ej sökt hjälp tidigare			Totalt		
	Ej i behov av hjälp	I behov av hjälp	Sum- ma	Ej i behov av hjälp	I behov av hjälp	Sum- ma	Ej i behov av hjälp	I behov av hjälp	Sum- ma
<i>Antal</i>									
20—34 år.....	25	11	36	100	5	105	125	16	141
35—49 ».....	38	12	50	100	11	112	139	23	162
50—64 ».....	22	14	36	81	4	85	103	18	121
65—w ».....	11	2	13	49	2	51	60	4	64
Summa	96	39	135	331	22	353	427	61	488
Därav:									
män.....	33	17	50	164	9	173	197	26	223
kvinnor.....	63	22	85	167	13	180	230	35	265
<i>Fördelning i %</i>									
20—34 år.....	69,4	30,6	100	95,2	4,8	100	88,6	11,4	100
35—49 ».....	76,0	24,0	100	90,0	10,0	100	85,8	14,2	100
50—64 ».....	61,1	38,9	100	95,3	4,7	100	85,1	14,9	100
65—w ».....	84,6	15,4	100	96,1	3,9	100	93,8	6,2	100
Summa	71,1	28,9	100	93,8	6,2	100	87,5	12,5	100
Därav:									
män.....	66,0	34,0	100	94,8	5,2	100	88,3	11,7	100
kvinnor.....	74,1	25,9	100	92,8	7,2	100	86,8	13,2	100

Tabell 14. Fördelning efter läkarbesök och sjukvård för nervösa besvär samt tidpunkt för vård, sökt hjälp m. m.

Önskad hjälp för nervösa besvär	Läkarbesök och sjukvård för nervösa besvär							
	Antal personer				I procent			
	Har ej sökt läkare eller sjukhus	Har sökt läkare	Har vårdats på sjukhus	Summa	Har ej sökt läkare eller sjukhus	Har sökt läkare	Har vårdats på sjukhus	Summa
<i>Önskad hjälp</i>								
Priv.prakt., ej nervspec..	3	5	—	8	0,8	4,2	—	1,6
» , psyk. eller nerv.spec.....	5	11	2	18	1,4	9,2	13,3	3,7
Läk.psyk. mottagn. eller psyk. poliklinik.....	4	3	2	9	1,1	2,5	13,3	1,9
Läk. på annan mottagn. eller poliklinik.....	2	1	—	3	0,6	0,8	—	0,6
Annan.....	2	3	—	5	0,6	2,5	—	1,0
Vet inte.....	3	1	1	5	0,9	0,8	6,7	1,0
Ej aktuellt.....	334	96	10	440	94,6	80,0	66,7	90,2
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Åsikt om behov av kurator o. d.</i>								
Nej.....	18	20	1	39	5,1	16,7	6,7	8,0
Ja, kurator.....	—	3	1	4	—	2,5	6,7	0,8
» , rådgivn.byrå.....	—	—	2	2	—	—	13,3	0,4
» , bådadera.....	—	1	—	1	—	0,8	—	0,2
Vet inte.....	1	—	1	2	0,3	—	6,7	0,4
Ej aktuellt.....	334	96	10	440	94,6	80,0	66,7	90,2
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Åsikt om behov av vård på sjukhus</i>								
Nej.....	14	21	2	37	4,0	17,5	13,3	7,6
Vård på sjukhus.....	1	—	—	1	0,3	—	—	0,2
Vistelse på vilohem....	—	3	3	6	—	2,5	20,0	1,2
Bådadera.....	1	—	—	1	0,3	—	—	0,2
Vet inte.....	3	—	—	3	0,8	—	—	0,6
Ej aktuellt.....	334	96	10	440	94,6	80,0	66,7	90,2
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Förekomst av övriga synpunkter</i>								
Nej.....	11	11	—	22	3,1	9,2	—	4,5
Ja.....	8	13	5	26	2,3	10,8	33,3	5,2
Ej aktuellt.....	334	96	10	440	94,6	80,0	66,7	90,2
Summa	353	120	15	488	100,0	100,0	100,0	100,0

Läkarbedömningar på grundval av intervjuvaren

Inledning

I det föregående har redovisats frekvenserna av en serie olika symtom. En del symtom torde få betecknas som triviala, andra är av mera allvarlig natur. Nu kan man vänta sig ett mer eller mindre kraftigt samband mellan olika symtom inom en och samma individ. Vissa ansatser har gjorts att undersöka detta. Man finner bl. a. att ingen av de intervjuade har alla symtom. Å andra sidan är det endast ett 40-tal personer, som anger sig vara utan några som helst besvär. 6 personer anger endast kroppsligt besvär. Den påfallande utbredningen på olika symtom och de oerhört många kombinationsmöjligheterna försvårar en samlad överblick.

Nämnda förhållande har varit anledningen till att — såsom nämnts i det föregående — tvenne läkare gjort sammanfattande bedömningar av varje intervjuperson med avseende på kroppsligt och psykiskt hälsotillstånd samt behov av konsultation för nervösa besvär. Därvid har en gradering skett med beaktande av alla de upplysningar, som intervjuvaren ger.

Förfaringssätt

I fråga om psykiskt hälsotillstånd har bedömningen skett i tre avseenden:

1) *Diagnos* med följande indelning

Psykos

Depression

Tvångsneuroser

Trötthetsreaktioner

Andra insufficienstagstillstånd

Personlighetsdrag, som kan tänkas disponera för neurotiska reaktioner

Friska

2) *Vissa symtom* med följande indelning

Psykosomatiska sjukdomar

Huvudvärk, migrän m. m.

Krampanfall, svimningsanfall

Åldersförändringar

Besvär i samband med övergångsåldern

Inga särskilda symtom

Tveksamma fall

- 3) *Sammanfattande omdöme om psykisk status* med följande indelning
- Sinnessjuka
 - Med nervösa besvär av allvarlig karaktär
 - Med nervösa besvär av lindrig karaktär
 - Psykiskt friska.

I fråga om vårdbehov har de intervjuade indelats i två grupper, nämligen

- 1) personer med behov av konsultation för nervösa besvär
- 2) personer utan behov av konsultation för nervösa besvär.

Beträffande kroppsligt hälsotillstånd har en klassificering skett efter

- 1) kroppsligt sjuka
- 2) fullt friska.

Med avseende på diagnoser, vissa symtom och sammanfattande omdöme om psykisk status har de båda läkarna oberoende av varandra utfört bedömningar av varje enskilt fall på grundval av intervjusvaren. Konsultationsbehov och kroppsligt hälsotillstånd har dels bedömts av den ene läkaren, dels av båda läkarna gemensamt.

Några av de principer, som följts vid bedömningen är följande:

1) i största möjliga utsträckning har varje intervjuperson hänförs till en bestämd kategori. Klassificering som »tveksamt fall» har medvetet undvikits;

2) om intervjupersonen själv ansett sig behöva hjälp för nervösa besvär, har vederbörande även vid bedömningen ansetts behöva konsultera läkare.

Resultat

Tab. 15 a och b utvisar absolut resp. procentuell fördelning på diagnoser enligt bedömarna (i dessa och följande tabeller betecknade som bedömare A och bedömare B). Samtidigt har en fördelning gjorts på kön och åldersgrupp (20—34 år, 35—49 år, 50—64 år, 65 och däröver).

Tab. 16 a och b visar absolut resp. procentuell fördelning på vissa nervösa symtom enligt bedömarna med samtidig fördelning på kön och åldersgrupper.

Tab. 17 a och b visar absolut resp. procentuell fördelning efter sammanfattande omdöme om psykisk status enligt bedömarna med samtidig fördelning på kön och åldersgrupper.

Tab. 18 visar det absoluta och procentuella antalet intervjupersoner i behov av konsultation för nervösa besvär med fördelning på kön och åldersgrupper. Tabellen utvisar resultatet dels enligt A:s bedömning, dels enligt gemensam bedömning av A och B.

Tab. 19 visar det absoluta och procentuella antalet intervjupersoner med kroppslig sjukdom, fördelat på kön och åldersgrupper. Tabellen utvisar resultatet dels enligt A:s bedömning, dels enligt gemensam bedömning av A och B.

Vi ser att det föreligger *systematiska skillnader* mellan de båda bedömnarna. Detta kan bero på:

- 1) svårigheten att bedöma fallen enbart på basis av intervju svaren;
- 2) olika uppfattningar hos bedömnarna om de olika symtomens svårhetsgrad.

Nyssnämnda tabeller anger *bruttoskillnaderna* mellan de båda bedömningarna, d. v. s. det samlade resultatet för olika kategorier av intervju personer. Därvid kan bl. a. konstateras följande med avseende på olika bedömningsfaktorer.

1) *Fördelning på diagnoser.* Bedömare B har bedömt något fler som helt friska i jämförelse med A; 224 personer mot 206 av sammanlagt 488 intervjuade. Bedömare A har hänfört flertalet av de icke friska till sådana med personlighetsdrag, disponerande för neurotiska reaktioner. Bedömare B har erhållit en jämnare fördelning på olika diagnoser och anser att personlighetsdrag, disponerande för neurotiska reaktioner, endast förekommer i 64 fall mot 168 fall enligt bedömare A.

2) *Fördelning på vissa symtom.* Bedömare B har erhållit något fler intervju personer utan särskilda symtom i jämförelse med A; 363 mot 330 personer. Mycket god överensstämmelse förekommer beträffande sådana symtom som krampanfall och svimningsanfall samt besvär i samband med övergångsåldern. De största avvikelserna förekommer i fråga om huvudvärk, migrän m. m. (31 personer enligt A mot 14 för B) samt psykosomatiska sjukdomar (83 personer enligt A mot 75 för B).

3) *Fördelning efter sammanfattande omdöme om psykisk status.* Bedömare A har bedömt fler intervju personer som fullt normala än B — 363 fall mot 273. Eljest är det påfallande att bedömare B ansett betydligt fler av de intervjuade ha nervösa besvär av allvarlig karaktär, under det att bedömare A därvidlag varit mer restriktiv. Antal personer med nervösa besvär av allvarlig karaktär har av bedömare A angetts till 12 mot 63 enligt B. Motsvarande siffror i fråga om lindriga nervösa symtom är 113 enligt A mot 148 enligt B.

4) *Andel personer i behov av konsultation för nervösa besvär.* Dels föreligger resultat av bedömningar enligt A, dels av gemensam bedömning av A och B. Möjligheter saknas därför till direkta jämförelser mellan de båda bedömnarna i ifrågavarande avseende. Enligt den gemensamma bedömningen uppgår konsultationsbehovet till 25,6 % och enligt bedömare A till 19,3 %.

5) *Andel kroppsligt sjuka.* Även i detta avseende föreligger resultat av bedömningar enligt A samt av gemensam bedömning av A och B. Enligt den gemensamma bedömningen är 30,1 % kroppsligt sjuka och enligt bedömare A är motsvarande siffra 35,9.

I syfte att ytterligare belysa metodiken har ett antal tabeller medtagits, som anger *nettoskillnaderna* mellan de båda bedömningarna. Detta inne-

bär simultana fördelningar på bedömare med avseende på de olika bedömningsfaktorerna.

Tab. 20 utvisar absolut och procentuell fördelning på kön och diagnoser med simultan fördelning efter bedömare.

Tab. 21 visar absolut och procentuell fördelning på kön och vissa symptom med simultan fördelning efter bedömare.

Tab. 22 visar absolut och procentuell fördelning på kön och sammanfattande omdöme av psykisk status med samtidig fördelning efter bedömare.

Tab. 23 visar andelen manliga och kvinnliga intervjupersoner i behov av konsultation för nervösa besvär med fördelning efter bedömare.

Tab. 24 visar andelen kroppsligt sjuka bland män och bland kvinnor med fördelning efter bedömare.

Dessa tabeller över nettoskillnaderna belyser på ett mer ingående sätt än tidigare tabeller metodfelens betydelse.

Tabell 15 a. Fördelning på diagnoser efter läkarbedömningar på grundval av intervju-svaren

Kön Ålder	Diagnoser								Samt- liga
	Psy- koser	De- pres- sioner	Tvångs- neuro- ser	Trött- hets- reak- tioner	Andra insuffici- enstill- stånd	Person- lighets- drag, disp. f. neur. reakt.	Friska	Tvek- sam- ma fall	
Enligt bedömare A									
Män									
20—34 år	—	4	2	4	5	23	23	—	61
35—49 »	—	3	2	6	5	31	42	—	89
50—64 »	—	2	—	6	3	18	19	—	48
65— »	—	2	—	1	3	4	15	—	25
Summa	—	11	4	17	16	76	99	—	223
Kvinnor									
20—34 »	—	5	3	6	5	28	33	—	80
35—49 »	—	4	10	1	3	30	25	—	73
50—64 »	—	8	2	7	6	21	29	—	73
65— »	—	3	—	2	1	13	20	—	39
Summa	—	20	15	16	15	92	107	—	265
Totalt	—	31	19	33	31	168	206	—	488
Enligt bedömare B									
Män									
20—34 år	—	4	1	12	9	8	26	1	61
35—49 »	—	9	2	11	8	13	44	2	89
50—64 »	—	5	1	8	3	7	24	—	48
65— »	—	2	—	2	3	2	16	—	25
Summa	—	20	4	33	23	30	110	3	223
Kvinnor									
20—34 år	—	5	3	9	8	17	38	—	80
35—49 »	—	15	2	9	6	10	31	—	73
50—64 »	1	11	2	19	11	4	25	—	73
65— »	—	2	—	9	4	3	20	1	39
Summa	1	33	7	46	29	34	114	1	265
Totalt	1	53	11	79	52	64	224	4	488

Tabell 15 b. Procentuell fördelning på diagnoser efter läkarbedömningar på grundval av intervjuavaren

Kön Ålder	Diagnoser								Samt- liga
	Psy- koser	De- pres- sion	Tvångs- neuro- ser	Trött- hets- reak- tioner	Andra insuffi- cienstill- stånd	Person- lighets- drag, disp. f. neur. reakt.	Friska	Tvek- sam- ma fall	
Enligt bedömare A									
Män									
20—34 år	—	6,5	3,3	6,6	8,2	37,7	37,7	—	100
35—49 »	—	3,4	2,3	6,7	5,6	34,8	47,2	—	100
50—64 »	—	4,2	—	12,5	6,2	37,5	39,6	—	100
65— »	—	8,0	—	4,0	12,0	16,0	60,0	—	100
Summa	—	4,9	1,8	7,6	7,2	34,1	44,4	—	100
Kvinnor									
20—34 år	—	6,3	3,7	7,5	6,3	35,0	41,2	—	100
35—49 »	—	5,5	13,7	1,4	4,1	41,1	34,2	—	100
50—64 »	—	11,0	2,7	9,6	8,2	28,8	39,7	—	100
65— »	—	7,7	—	5,1	2,6	33,3	51,3	—	100
Summa	—	7,5	5,7	6,0	5,7	34,7	40,4	—	100
Totalt	—	6,4	3,9	6,8	6,3	34,4	42,2	—	100
Enligt bedömare B									
Män									
20—34 år	—	6,6	1,6	19,7	14,8	13,1	42,6	1,6	100
35—49 »	—	10,1	2,2	12,4	9,0	14,6	49,4	2,3	100
50—64 »	—	10,4	2,1	16,7	6,2	14,6	50,0	—	100
65— »	—	8,0	—	8,0	12,0	8,0	64,0	—	100
Summa	—	9,0	1,8	14,8	10,3	13,5	49,3	1,3	100
Kvinnor									
20—34 år	—	6,2	3,7	11,3	10,0	21,3	47,5	—	100
35—49 »	—	20,6	2,7	12,3	8,2	13,7	42,5	—	100
50—64 »	1,4	15,1	2,7	26,0	15,1	5,5	34,2	—	100
65— »	—	5,1	—	23,1	10,3	7,7	51,3	2,5	100
Summa	0,4	12,5	2,6	17,4	10,9	12,8	43,0	0,4	100
Totalt	0,2	10,9	2,2	16,2	10,7	13,1	45,9	0,8	100

Tabell 16 a. Fördelning på vissa symtom efter läkarbedömningar på grundval av intervjuvaren

Kön Ålder	Vissa symtom							Samt- liga
	Psyko- soma- t. sjuk- domar	Huvud- värk, migrän m. m.	Kramp- anfall, svim- nings- anfall	Ålders- föränd- ringar	Besvär i samband med över- gångs- åldern	Inga särskilda sym- tom	Tvek- samma fall	
Enligt bedömare A								
Män								
20—34 år	4	8	4	—	—	45	—	61
35—49 »	4	9	2	—	—	69	5	89
50—64 »	5	6	—	—	—	35	2	48
65— »	3	1	—	6	—	14	1	25
Summa	16	24	6	6	—	163	8	223
Kvinnor								
20—34 år	4	22	1	—	—	53	—	80
35—49 »	8	22	—	—	5	37	1	73
50—64 »	2	11	2	4	4	50	—	73
65— »	1	4	—	6	—	27	1	39
Summa	15	59	3	10	9	167	2	265
Totalt	31	83	9	16	9	330	10	488
Enligt bedömare B								
Män								
20—34 år	2	9	2	—	—	48	—	61
35—49 »	4	11	2	—	—	72	—	89
50—64 »	2	5	—	—	—	40	1	48
65— »	—	2	—	5	—	18	—	25
Summa	8	27	4	5	—	178	1	223
Kvinnor								
20—34 år	3	19	1	—	—	54	3	80
35—49 »	2	17	2	—	4	48	—	73
50—64 »	1	7	2	1	5	57	—	73
65— »	—	5	1	7	—	26	—	39
Summa	6	48	6	8	9	185	3	265
Totalt	14	75	10	13	9	363	4	488

Tabell 16 b. Procentuell fördelning på vissa symtom efter läkarbedömningar på grundval av intervjuvaren

Kön Ålder		Vissa symtom						Samtliga	
		Psyko-somat. sjukdomar	Huvudvärk, migrän m. m.	Kramp-anfall, svimningsanfall	Åldersförändringar	Besvär i samband med övergångs-åldern	Inga särskilda symtom		Tveksamma fall
<i>Män</i>		<i>Enligt bedömare A</i>							
20—34 år ...		6,5	13,1	6,6	—	—	73,8	—	100
35—49 » ...		4,5	10,1	2,3	—	—	77,5	5,6	100
50—64 » ...		10,4	12,5	—	—	—	72,9	4,2	100
65— » ...		12,0	4,0	—	24,0	—	56,0	4,0	100
Summa		7,2	10,7	2,7	2,7	—	73,1	3,6	100
<i>Kvinnor</i>									
20—34 år ...		5,0	27,5	1,2	—	—	66,3	—	100
35—49 » ...		11,0	30,1	—	—	6,8	50,7	1,4	100
50—64 » ...		2,7	15,1	2,7	5,5	5,5	68,5	—	100
65— »		2,6	10,2	—	15,4	—	69,2	2,6	100
Summa		5,7	22,3	1,1	3,8	3,4	63,0	0,7	100
Totalt		6,4	17,0	1,8	3,3	1,8	67,6	2,1	100
		<i>Enligt bedömare B</i>							
<i>Män</i>									
20—34 år ...		3,3	14,7	3,3	—	—	78,7	—	100
35—49 » ...		4,5	12,4	2,2	—	—	80,9	—	100
50—64 » ...		4,2	10,4	—	—	—	83,3	2,1	100
65— » ...		—	8,0	—	20,0	—	72,0	—	100
Summa		3,6	12,1	1,8	2,2	—	79,8	0,5	100
<i>Kvinnor</i>									
20—34 år ...		3,8	23,7	1,2	—	—	67,5	3,8	100
35—49 » ...		2,7	23,3	2,7	—	5,5	65,8	—	100
50—64 » ...		1,4	9,6	2,7	1,4	6,8	78,1	—	100
65— » ...		—	12,8	2,6	17,9	—	66,7	—	100
Summa		2,3	18,1	2,3	3,0	3,4	69,8	1,1	100
Totalt		2,9	15,4	2,0	2,7	1,8	74,4	0,8	100

Tabell 17 a. Fördelning efter sammanfattande omdöme enligt läkarbedömningar på grundval av intervju svaren

Kön Ålder		Sammanfattande omdöme					Samt- liga
		Sinnes- sjuka	Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	Med lindriga nervösa symtom	Psykiskt friska	Tvek- samma fall	
<i>Män</i>		<i>Enligt bedömare A</i>					
20—34 år	—	1	14	46	—	61	
35—49 »	—	—	16	73	—	89	
50—64 »	—	2	11	35	—	48	
65— »	—	1	5	19	—	25	
Summa	—	4	46	173	—	223	
<i>Kvinnor</i>							
20—34 år	—	1	19	60	—	80	
35—49 »	—	1	23	49	—	73	
50—64 »	—	3	20	50	—	73	
65— »	—	3	5	31	—	39	
Summa	—	8	67	190	—	265	
Totalt	—	12	113	363	—	488	
		<i>Enligt bedömare B</i>					
<i>Män</i>							
20—34 år	—	6	19	35	1	61	
35—49 »	—	11	22	54	2	89	
50—64 »	—	6	11	31	—	48	
65— »	—	—	8	17	—	25	
Summa	—	23	60	137	3	223	
<i>Kvinnor</i>							
20—34 år	—	8	30	42	—	80	
35—49 »	—	15	20	38	—	73	
50—64 »	—	13	27	33	—	73	
65— »	—	4	11	23	1	39	
Summa	—	40	88	136	1	265	
Totalt	—	63	148	273	4	488	

Tabell 17 b. Procentuell fördelning efter sammanfattande omdöme enligt läkarbedömningar på grundval av intervjuvaren

Kön Ålder		Sammanfattande omdöme					Samt- liga
		Sinnes- sjuka	Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	Med lindriga nervösa symtom	Psykiskt friska	Tvek- samma fall	
<i>Män</i>		<i>Enligt bedömare A</i>					
20—34 år.....	—	1,6	23,0	75,4	—	100	
35—49 ».....	—	—	18,0	82,0	—	100	
50—64 ».....	—	4,2	22,9	72,9	—	100	
65— ».....	—	4,0	20,0	76,0	—	100	
Summa		—	1,8	20,6	77,6	—	100
<i>Kvinnor</i>							
20—34 år.....	—	1,2	23,8	75,0	—	100	
35—49 ».....	—	1,4	31,5	67,1	—	100	
50—64 ».....	—	4,1	27,4	68,5	—	100	
65— ».....	—	7,7	12,8	79,5	—	100	
Summa		—	3,0	25,3	71,7	—	100
Totalt		—	2,5	23,1	74,4	—	100
<i>Män</i>		<i>Enligt bedömare B</i>					
20—34 år.....	—	9,8	31,2	57,4	1,6	100	
35—49 ».....	—	12,4	24,7	60,7	2,2	100	
50—64 ».....	—	12,5	22,9	64,6	—	100	
65— ».....	—	—	32,0	68,0	—	100	
Summa		—	10,3	26,9	61,4	1,4	100
<i>Kvinnor</i>							
20—34 år.....	—	10,0	37,5	52,5	—	100	
35—49 ».....	—	20,5	27,4	52,1	—	100	
50—64 ».....	—	17,8	37,0	45,2	—	100	
65— ».....	—	10,2	28,2	59,0	2,6	100	
Summa		—	15,1	33,2	51,3	0,4	100
Totalt		—	12,9	30,3	56,0	0,8	100

Tabell 18. I behov av konsultation för nervösa besvär enligt läkarbedömningar på grundval av intervjuvaren

Kön Ålder	Antal personer	Därav i behov av konsultation för nervösa besvär			
		Enligt bedömare A		Enligt gemensam bedömning av A och B	
		Antal	I procent	Antal	I procent
<i>Män</i>					
20—34 år	61	11	18,0	16	26,2
35—49 »	89	14	15,7	21	23,6
50—64 »	48	10	20,8	10	20,8
65— »	25	3	12,0	2	8,0
Summa	223	38	17,0	49	22,0
<i>Kvinnor</i>					
20—34 år	80	14	17,5	23	28,8
35—49 »	73	18	24,7	23	31,5
50—64 »	73	18	24,7	25	34,2
65— »	39	6	15,4	5	12,8
Summa	265	56	21,1	76	28,7
<i>Samtliga</i>					
20—34 år	141	25	17,7	39	27,7
35—49 »	162	32	20,0	44	27,2
50—64 »	121	28	23,1	35	28,9
65— »	64	9	14,1	7	10,9
Summa	488	94	19,3	125	25,6

Tabell 19. Andel kroppsligt sjuka enligt läkarbedömningar på grundval av intervjuvaren

Kön Ålder	Antal personer	Därav kroppsligt sjuka			
		Enligt bedömare A		Enligt gemensam bedömning av A och B	
		Antal	I procent	Antal	I procent
<i>Män</i>					
20—34 år	61	10	16,4	8	13,1
35—49 »	89	29	32,6	26	29,2
50—64 »	48	24	50,0	17	35,4
65— »	25	13	52,0	14	56,0
Summa	223	76	34,1	65	29,1
<i>Kvinnor</i>					
20—34 år	80	14	17,5	9	11,3
35—49 »	73	24	32,9	17	23,3
50—64 »	73	39	53,4	37	50,7
65— »	39	22	56,4	19	48,7
Summa	265	99	37,4	82	30,9
<i>Samtliga</i>					
20—34 år	141	24	17,1	17	12,1
35—49 »	162	53	32,7	43	26,5
50—64 »	121	63	52,1	54	44,6
65— »	64	35	54,7	33	51,6
Summa	488	175	35,9	147	30,1

Tabell 20. Jämförelse mellan fördelning på diagnoser enligt två olika bedömare

Bedömare A Bedömare B	Diagnoser								
	Psy- koser	De- pres- sioner	Tvångs- neuro- ser	Trött- hets- reak- tioner	Andra insuff.- tillstånd	Person- lighets- drag, disp. f. neur. reakt.	Friska	Tvek- sam- ma fall	Sum- ma
<i>Män</i>	<i>Absolut antal</i>								
Psykosor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Depressioner	—	9	—	2	5	3	1	—	20
Tvångsneuroser	—	—	2	—	1	1	—	—	4
Trötthetsreaktioner	—	2	—	9	—	18	4	—	33
Andra insuff.tillst.	—	—	1	4	8	10	—	—	23
Personlighetsdrag, disp. f. neur. reakt.	—	—	1	1	1	23	4	—	30
Friska	—	—	—	1	1	20	88	—	110
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	1	2	—	3
Summa	—	11	4	17	16	76	99	—	223
<i>Kvinnor</i>									
Psykosor	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Depressioner	—	14	1	1	6	10	1	—	33
Tvångsneuroser	—	—	3	—	2	2	—	—	7
Trötthetsreaktioner	—	1	—	10	—	22	13	—	46
Andra insuff.tillst.	—	3	7	3	5	10	1	—	29
Personlighetsdrag, disp. f. neur. reakt.	—	—	4	—	1	22	7	—	34
Friska	—	1	—	2	1	25	85	—	114
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Summa	—	20	15	16	15	92	107	—	265
<i>Män</i>	<i>Procentuellt antal</i>								
Psykosor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Depressioner	—	4,0	—	0,9	2,2	1,4	0,5	—	9,0
Tvångsneuroser	—	—	0,9	—	0,5	0,4	—	—	1,8
Trötthetsreaktioner	—	0,9	—	4,0	—	8,1	1,8	—	14,8
Andra insuff.tillst.	—	—	0,4	1,8	3,6	4,5	—	—	10,3
Personlighetsdrag, disp. f. neur. reakt.	—	—	0,5	0,5	0,4	10,3	1,8	—	13,5
Friska	—	—	—	0,4	0,5	9,0	39,4	—	49,3
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	0,4	0,9	—	1,3
Summa	—	4,9	1,8	7,6	7,2	34,1	44,4	—	100,0
<i>Kvinnor</i>									
Psykosor	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4
Depressioner	—	5,2	0,4	0,4	2,2	3,8	0,4	—	12,4
Tvångsneuroser	—	—	1,1	—	0,8	0,7	—	—	2,6
Trötthetsreaktioner	—	0,4	—	3,8	—	8,3	4,9	—	17,4
Andra insuff.tillst.	—	1,1	2,7	1,1	1,9	3,8	0,4	—	11,0
Personlighetsdrag, disp. f. neur. reakt.	—	—	1,5	—	0,4	8,3	2,6	—	12,8
Friska	—	0,4	—	0,7	0,4	9,4	32,1	—	43,0
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4
Summa	—	7,5	5,7	6,0	5,7	34,7	40,4	—	100,0

Tabell 21. Jämförelse mellan fördelning efter vissa symtom enligt två olika bedömare

Bedömare A Bedömare B	Vissa symtom							
	Psyko- soma- t. sjuk- domar	Huvud- värk, migrän m. m.	Kramp- anfall, svim- nings- anfall	Ålders- föränd- ringar	Besvär i samband med över- gångs- åldern	Inga sär- skilda symtom	Tvek- sam- ma fall	Sum- ma
<i>Män</i>	<i>Absolut antal</i>							
Psykosomat. sjukd.	6	1	—	—	—	1	—	8
Huvudvärk, migrän m.m.	2	20	—	1	—	4	—	27
Krampanfall, svimnings- anfall	—	—	4	—	—	—	—	4
Åldersförändringar	1	—	—	2	—	2	—	5
Besvär i samband med övergångsåldern	—	—	—	—	—	—	—	—
Inga särsk. symtom	7	3	2	3	—	155	8	178
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	1	—	1
Summa	16	24	6	6	—	163	8	223
<i>Kvinnor</i>								
Psykosomat. sjukd.	4	2	—	—	—	—	—	6
Huvudvärk, migrän m.m.	4	40	—	1	1	2	—	48
Krampanfall, svimnings- anfall	—	—	2	1	—	3	—	6
Åldersförändringar	—	—	—	1	—	7	—	8
Besvär i samband med övergångsåldern	—	—	—	—	5	4	—	9
Inga särsk. symtom	7	17	1	7	3	148	2	185
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	3	—	3
Summa	15	59	3	10	9	167	2	265
<i>Män</i>	<i>Procentuellt antal</i>							
Psykosomat. sjukdomar	2,7	0,5	—	—	—	0,4	—	3,6
Huvudvärk, migrän m.m.	0,9	9,0	—	0,4	—	1,8	—	12,1
Krampanfall, svimnings- anfall	—	—	1,8	—	—	—	—	1,8
Åldersförändringar	0,4	—	—	0,9	—	0,9	—	2,2
Besvär i samband med övergångsåldern	—	—	—	—	—	—	—	—
Inga särsk. symtom	3,1	1,3	0,9	1,4	—	69,5	3,6	79,8
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5
Summa	7,1	10,8	2,7	—	—	73,1	3,6	100,0
<i>Kvinnor</i>								
Psykosomat. sjukd.	1,5	0,8	—	—	—	—	—	2,3
Huvudvärk, migrän m.m.	1,5	15,1	—	0,4	0,4	0,7	—	18,1
Krampanfall, svimnings- anfall	—	—	0,7	0,4	—	1,2	—	2,3
Åldersförändringar	—	—	—	0,4	—	2,6	—	3,0
Besvär i samband med övergångsåldern	—	—	—	—	1,9	1,5	—	3,4
Inga särskilda symtom	2,7	6,4	0,4	2,6	1,1	55,9	0,7	69,8
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	1,1	—	1,1
Summa	5,7	22,3	1,1	3,8	3,4	63,0	0,7	100,0

Tabell 22. Jämförelse mellan fördelning efter sammanfattande omdöme om psykisk status enligt två olika bedömare

Bedömare A \ Bedömare B	Sammanfattande omdöme					
	Sin- nes- sjuka	Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	Med lindriga nervösa sym- tom	Psyiskt friska	Tvek- sam- ma fall	Sum- ma
<i>Män</i>						
<i>Absolut antal</i>						
Sinnessjuka	—	—	—	—	—	—
Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	—	2	15	6	—	23
Med lindriga nervösa symtom	—	—	28	32	—	60
Fullt normala	—	2	3	132	—	137
Tveksamma fall	—	—	—	3	—	3
Summa	—	4	46	173	—	223
<i>Kvinnor</i>						
Sinnessjuka	—	—	—	—	—	—
Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	—	5	29	6	—	40
Med lindriga nervösa symtom	—	2	31	55	—	88
Fullt normala	—	1	7	128	—	136
Tveksamma fall	—	—	—	1	—	1
Summa	—	8	67	190	—	265
<i>Män</i>						
<i>Procentuellt antal</i>						
Sinnessjuka	—	—	—	—	—	—
Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	—	0,9	6,7	2,7	—	10,3
Med lindriga nervösa symtom	—	—	12,6	14,3	—	26,9
Fullt normala	—	0,9	1,3	59,2	—	61,4
Tveksamma fall	—	—	—	1,4	—	1,4
Summa	—	1,8	20,6	77,6	—	100,0
<i>Kvinnor</i>						
Sinnessjuka	—	—	—	—	—	—
Med nervösa besvär av allvarlig karaktär	—	1,9	10,9	2,3	—	15,1
Med lindriga nervösa symtom	—	0,8	11,7	20,7	—	33,2
Fullt normala	—	0,3	2,7	48,3	—	51,3
Tveksamma fall	—	—	—	0,4	—	0,4
Summa	—	3,0	25,3	71,7	—	100,0

Tabell 23. Jämförelse mellan andelen i behov av konsultation för nervösa besvär enligt bedömare A och enligt gemensam bedömning av A och B

Enligt bedö- mare A Enligt gemensam bedömning av A och B	Konsultationsbehov					
	Antal			I procent		
	I behov av kon- sultation	Ej i behov av konsul- tation	Summa	I behov av kon- sultation	Ej i behov av konsul- tation	Summa
<i>Män</i>						
I behov av konsultation. . . .	34	15	49	15,2	6,8	22,0
Ej i behov av konsultation . .	4	170	174	1,8	76,2	78,0
Summa	38	185	223	17,0	83,0	100,0
<i>Kvinnor</i>						
I behov av konsultation. . . .	50	26	76	18,9	9,8	28,7
Ej i behov av konsultation . .	6	183	189	2,2	69,1	71,3
Summa	56	209	265	21,1	78,9	100,0
<i>Samtliga</i>						
I behov av konsultation. . . .	84	41	125	17,2	8,4	26,0
Ej i behov av konsultation . .	10	353	363	2,1	72,3	74,4
Summa	94	394	488	19,3	80,7	100,0

Tabell 24. Jämförelse mellan andelen kroppsligt sjuka enligt bedömare A och enligt gemensam bedömning av A och B

Enligt bedö- mare A Enligt gemensam bedömning av A och B	Kroppsligt hälsotillstånd							
	Antal				I procent			
	Kroppss- ligt sjuk	Fullt frisk	Tvek- samma fall	Summa	Kroppss- ligt sjuk	Fullt frisk	Tvek- samma fall	Summa
<i>Män</i>								
Kroppsligt sjuk	63	2	—	65	28,3	0,9	—	29,2
Fullt frisk.	13	145	—	158	5,8	65,0	—	70,8
Tveksamma fall	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	76	147	—	223	34,1	65,9	—	100,0
<i>Kvinnor</i>								
Kroppsligt sjuk	79	3	—	82	29,8	1,1	—	30,9
Fullt frisk.	18	161	—	179	6,8	60,8	—	67,6
Tveksamma fall	2	2	—	4	0,8	0,7	—	1,5
Summa	99	166	—	265	37,4	62,6	—	100,0
<i>Samtliga</i>								
Kroppsligt sjuk	142	5	—	147	29,1	1,0	—	30,1
Fullt frisk.	31	306	—	337	6,4	62,7	—	69,1
Tveksamma fall	2	2	—	4	0,4	0,4	—	0,8
Summa	175	313	—	488	35,9	64,1	—	100,0

*Vissa uppskattningar av totala värden för hela den vuxna
befolkningen i Stockholm*

Siffror för Stockholms hela befolkning över 20 år har framräknats i några avseenden. Resultaten finnes återgivna i följande tabeller:

Tab. 25 anger uppskattat antal personer, som enligt egen uppfattning är i behov av hjälp för nervösa besvär. Uppskattningen har gjorts dels för män och kvinnor, dels för olika åldersgrupper.

Tab. 26 anger uppskattat antal personer med nervösa symtom av allvarlig eller lindrig art (med utgångspunkt från läkarbedömningar av de intervjuades psykiska hälsotillstånd). Uppskattningen har gjorts för män och kvinnor i olika åldersgrupper.

Tab. 27 anger uppskattat antal personer i behov av konsultation för nervösa besvär (med utgångspunkt från läkarbedömningar av de intervjuades konsultationsbehov). Uppskattningen har gjorts för män och kvinnor i olika åldersgrupper.

Tab. 28 anger uppskattat antal personer med kroppslig sjukdom (med utgångspunkt från läkarbedömningar av de intervjuades kroppsliga hälsotillstånd). Uppskattningar har gjorts för män och kvinnor i olika åldersgrupper.

Tabell 25. Uppskattat antal vuxna stockholmare, som enligt egen uppfattning är i behov av hjälp för nervösa besvär¹

Kön Ålder	Den procentuella andelen bland de intervjuade, som anser sig ha behov av hjälp för nervösa besvär	Uppskattat antal vuxna stockholmare som anser sig ha behov av hjälp för nervösa besvär	95-procentiga konfidensgränser	
			Undre gräns	Övre gräns
<i>Män</i>				
20—34 år.....	13,6	10 700	6 100	19 100
35—49 ».....	10,2	9 300	4 300	16 500
50—64 ».....	17,0	10 600	4 700	18 900
65—w ».....	4,8	1 600	—	6 600
Summa	11,7	32 200	21 700	45 500
<i>Kvinnor</i>				
20—34 år.....	10,0	8 400	3 700	15 800
35—49 ».....	19,2	19 700	11 200	30 900
50—64 ».....	13,7	11 300	5 600	19 600
65—w ».....	7,7	4 000	800	10 600
Summa	13,2	43 400	30 900	58 500
Totalt	12,5	75 600	59 200	94 900

¹ Gruppen »i behov av hjälp» innefattar som tidigare nämnts sådana, som antingen erhåller hjälp för nervösa besvär eller svarat ja eller ställt sig tveksamma på frågan: »Anser Ni själv, att Ni för närvarande behöver söka hjälp i någon form för nervösa besvär?»

De uppskattade antalen — estimaten — anges med 95-procentiga konfidensintervall, vilket innebär att angivna intervall med 95-procentig säkerhet innesluter det »sanna» värdet.

Man måste dock observera att uttalanden om »sanna» värdet påverkas av:

- 1) metodfel vid själva intervjun
- 2) systematiska fel vid bedömningen av intervjusvaren
- 3) bortfallets eventuella effekt.

Dessa förhållanden innebär givetvis, att de gjorda uppskattningarna inte kan göra anspråk på någon exakticitet.

Vid beräkningarna har använts befolkningsuppgifter avseende den 1 nov. 1956.

Tabell 26. Uppskattat antal vuxna stockholmare med nervösa symtom på basis av läkarbedömningar av de intervjuade

Kön Ålder	Den procentuella andelen bland de intervjuade med nervösa sym- tom	Uppskattat antal vuxna stockholmare med nervösa symtom	95-procentiga konfidens- gränser	
			Undre gräns	Övre gräns
Män				
Enligt bedömare A				
20—34 år.....	24,6	19 400	11 600	29 800
35—49 ».....	18,0	16 400	9 600	26 000
50—64 ».....	27,1	16 900	9 600	26 100
65—w ».....	24,0	7 700	3 000	14 500
Summa	22,4	60 400	47 100	75 400
Kvinnor				
20—34 år.....	25,0	21 000	13 500	30 100
35—49 ».....	32,9	33 800	23 100	46 000
50—64 ».....	31,5	26 000	17 500	35 800
65—w ».....	20,5	10 700	5 000	19 500
Summa	28,3	91 500	74 600	110 600
Totalt	25,6	151 900	130 100	175 200
Män				
Enligt bedömare B				
20—34 år.....	41,0	32 300	22 600	42 700
35—49 ».....	37,1	33 800	24 900	43 700
50—64 ».....	35,4	22 100	13 900	31 600
65—w ».....	32,0	10 300	4 800	17 200
Summa	37,2	98 500	81 800	116 200
Kvinnor				
20—34 år.....	47,5	39 900	30 600	49 500
35—49 ».....	47,9	49 200	37 200	61 400
50—64 ».....	54,8	45 300	35 300	54 800
65—w ».....	38,4	20 000	12 300	28 900
Summa	48,3	154 400	134 300	174 200
Totalt	43,2	252 900	227 400	278 900

Tabell 27. Uppskattat antal vuxna stockholmare, som är i behov av konsultation för nervösa besvär med utgångspunkt från gemensam läkarbedömning av de intervjuade

Kön Ålder	Den procentuella andelen bland de intervjuade, som är i behov av konsultation för nervösa besvär	Uppskattat antal vuxna stockholmare, som är i behov av konsultation för nervösa besvär	95-procentiga konfidensgränser	
			Undre gräns	Övre gräns
<i>Män</i>				
20—34 år	26,2	20 600	12 500	30 800
35—49 »	23,6	21 500	14 100	30 700
50—64 »	20,8	13 000	6 500	21 700
65— »	8,0	2 600	300	8 400
Summa	22,0	57 700	43 900	73 600
<i>Kvinnor</i>				
20—34 år	28,8	24 200	16 300	33 500
35—49 »	31,5	32 400	21 900	44 500
50—64 »	34,2	28 200	19 500	38 000
65— »	12,8	6 700	2 200	14 000
Summa	28,7	91 500	74 900	110 900
Totalt	25,6	149 200	126 000	174 600

Tabell 28. Uppskattat antal vuxna stockholmare med kroppslig sjukdom med utgångspunkt från gemensam läkarbedömning av de intervjuade

Kön Ålder	Andelen bland de intervjuade med kroppslig sjukdom	Uppskattat antal vuxna stockholmare med kroppslig sjukdom	95-procentiga konfidensgränser	
			Undre gräns	Övre gräns
<i>Män</i>				
20—34 år	13,1	10 300	4 600	19 300
35—49 »	29,2	26 600	18 400	36 200
50—64 »	35,4	22 100	13 900	31 600
65— »	56,0	18 100	11 300	24 400
Summa	29,1	77 100	61 900	94 200
<i>Kvinnor</i>				
20—34 år	11,3	9 500	4 400	17 000
35—49 »	23,3	23 900	14 800	35 800
50—64 »	50,7	41 900	31 500	51 100
65— »	48,7	25 400	17 000	34 000
Summa	30,9	100 700	82 900	119 600
Totalt	30,1	177 800	154 100	202 800

Sammanfattande diskussion

Enligt instruktionen för lokalombuden var avsikten med undersökningen: »... skall studera allmänhetens uppfattning om sitt psykiska hälsotillstånd och speciellt förekomsten av nervösa symtom. Syftet är att undersökningsresultaten skall utgöra ett bidrag vid bedömandet av hjälpbehovet för dessa slags sjukdomar.» I det föregående har redovisats förekomsten av olika symtom, sökt hjälp och behov av hjälp för nervösa besvär enligt de intervjuades uppfattning om sitt tillstånd samt resultaten av läkarbedömningar med avseende på psykiskt och kroppsligt hälsotillstånd samt behov av konsultation. Vissa uppskattningar av totalvärden har även givits.

I en undersökning av denna art måste man räkna med vissa felkällor. De intervjuades egen uppfattning om sitt tillstånd och hjälpbehov är psykologiskt färgad och själva intervjun kan vara behäftad med vissa metodfel. Även läkarbedömningarna innesluter vissa felkällor; bedömarnas åsikter går såsom tidigare redovisats rätt mycket isär. Vidare får man beakta bortfallets eventuellt snedvridande effekt.

Angivna frekvenstal får därför inte pressas för hårt. Undersökningsresultaten anger snarast storleksordningen av förekomsten av nervösa besvär och hjälpbehovet för dessa slags sjukdomar, vilket dock torde vara av mycket stort intresse. Man kan se av resultaten, att utbredningen av nervösa besvär är stor och det latent behovet av hjälp i detta avseende är betydande.

Rapporten har icke behandlat frågor, som gäller kausalsamband mellan förekomst av nervösa symtom och sociala och demografiska attribut. Detta motiveras dels av att frågan faller utanför uppdraget, dels av problemets svårighetsgrad. Frågeformuläret innehåller emellertid data, som eventuellt skulle kunna utnyttjas för ett närmare studium. I så fall får detta uppfattas som en forskningsuppgift på något längre sikt.

NEUROSUNDERSÖKNINGEN 1957

Loko lp nr:.....

Dag för intervjun:.... / Intervjun påbörjad kl avslutad kl

1	1 2 3	Är Ni själv lägenhetsinnehavare medlem av hushåll, där någon annan är lägenhetsinnehavare inneboende Anm.												
2		Först skulle jag vilja veta vilka, som bor i den här lägenheten, (för inneboende: rummet [rummen]) och börjar då med Er själv <table border="0"> <tr> <td>Kön</td> <td>Är..... ogift, gift, änka, änkling, från- skild?</td> <td>Vilket år är född?</td> <td>Vilket yrke har Om pensionär: ange f. d. yrke</td> </tr> <tr> <td>lp själv</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Ange för övriga personer deras relation till lp</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Kön	Är..... ogift, gift, änka, änkling, från- skild?	Vilket år är född?	Vilket yrke har Om pensionär: ange f. d. yrke	lp själv				Ange för övriga personer deras relation till lp			
Kön	Är..... ogift, gift, änka, änkling, från- skild?	Vilket år är född?	Vilket yrke har Om pensionär: ange f. d. yrke											
lp själv														
Ange för övriga personer deras relation till lp														
3	1 2 3	Om 1:1 eller 2 Har lägenheten eget kök egen kokvrå varken kök eller kokvrå Anm.												
4		Om 1:1 eller 2 Hur många bostadsrum finns det i lägenheten?st												
5		Hur många rum disponerar Ni för egen del?st												
6		Hur stor är den ungefärliga bostadsyta som Ni disponerar för egen del?m ²												
7	0 1	Har Ni centralvärme? Nej Ja												

8		Till Loko Kan bostaden betecknas som 1 modern 2 halvmodern 3 omodern Anmärkningar rörande särskilda brister hos lägenheten:
9	0	Har Ni förvärvsarbete för närvarande? Nej Om ja. Vilken arbetstid har Ni? Om Ip har skiftesarbete eller på annat sätt oregelbunden arbetstid, skall Loko tydligt ange detta
10		Var är Ni född?
11	1	Hur många år har Ni sammanlagt bott i Stockholmstrakten? Alltid år Anm.
12	0 1	Jag övergår nu till att fråga om ert hälsotillstånd och börjar med att fråga: Lider Ni för närvarande av någon sjukdom eller invaliditet? 0 Nej Gå över till fråga 17 1 Ja Anm.
13		De följande frågorna 13—16 ställs endast om 12:1 Skulle Ni vilja ange sjukdomens (eller invaliditetens) art?
14	0 1	Har Ni några smärtor? 0 Nej 1 Ja Anm.
15	0 1	Om yrkesverksam. Är Ni för närvarande hemma från arbetet på grund av Ert tillstånd? 0 Nej 1 Ja Anm.
16		På vad sätt påverkar Ert tillstånd a) arbetsförmågan? b) rörelseförmågan?

17	0 1	Har Ni några besvär med sömnen? Nej <i>Gå över till fråga 19</i> Ja Anm.
18	1 2 3 0	<i>Om 17:1</i> <i>Läs upp alternativen och markera ett eller flera</i> Har Ni svårt att somna på kvällarna? Brukar Ni ligga vakna flera timmar i följd under natten? Brukar Ni vakna ett par timmar tidigare än Ni önskar? Har Ni några andra besvär med sömnen? Nej <i>Om ja. Vilka?</i>
19		a) Hur många timmar sover Ni i allmänhet pr dygn? timmar Anm. b) När brukar Ni gå till sängs? Kl..... Anm.
20	0 1	Brukar Ni lida av trötthetskänslor? Nej <i>Gå över till fråga 22</i> Ja Anm.
21	1 2 3 0	<i>Om 19:1</i> <i>Läs upp alternativen och markera ett eller flera</i> Lider Ni av trötthet innan Ni börjar dagens arbete? Får Ni ibland en plötslig trötthet under arbetsdagens lopp? Lider Ni av trötthet efter arbetsdagens slut? Lider Ni av trötthet på annat sätt (t. ex. på arbetsfria dagar)? Nej <i>Om ja. På vilket sätt?</i> Har Ni någon förklaring till Er trötthet?
22	0 1	Känner Ni Er för närvarande nedstämd eller deprimerad? Nej Ja Anm.
23	0	<i>Om 22:1</i> a) Har något sorgligt inträffat, som förklarar detta? Nej <i>Om ja. När ungefär?</i> Anm. b) Har Ni varit utsatt för någon form av psykisk press, som orsakar Er nedstämdhet?

23	0	Nej Om ja. Vad?
24	0 1	Har Ni tidigare haft någon period av nedstämdhet eller depression då Ni känt Er tungsint, missmodig eller sorgsen? Nej Ja Anm.
25	0 1	Om 24:1 a) Hade något sorgligt inträffat som förklarade detta? Nej Ja Anm. b) Var Ni utsatt för någon annan form av psykisk press, som orsakade Er nedstämdhet? Nej Om ja. Vad?
26	0 1	Om 22:1 och (eller) 24:1 Har Ni någon gång varit så ledsen, att Ni tyckte det varit svårt eller meningslöst att leva? Nej Ja Anm.
27	1 2 3	Läs upp alternativen och markera ett eller flera Blir Ni lätt irriterad av ljud och buller? Blir Ni lätt irriterad av påfrestningar i arbetet? Blir Ni lätt irriterad av påfrestningar i hemmet? Är det något annat som lätt gör Er irriterad? I så fall vad?
28	0 1	Tycker Ni själv att Ni ofta blir så irriterad eller förargad att det är plågsamt för Er? Nej Ja Anm.
29	0 1	Om 28:1 och lp är man Spelar spriten därvidlag en roll? Nej Ja Anm.
30	0 1	Har Ni en benägenhet att bli ängslig eller orolig? Nej Ja Anm. Skulle Ni vilja ge exempel på hur Ni känner det?

31	1	a)
	2	Får Ni ångestkänslor av motgångar och tråkigheter?
	3	Får Ni ångest då Ni fruktar att något obehagligt skall inträffa?
	9	Får Ni ångest utan att Ni själv vet varför? (Intet av detta)
		Anm.
		b)
		Skulle Ni vilja ge exempel på hur Ni känner det?
32	0	Nej
	1	Ja
		Anm.
33	0	Brukar Ni känna Er rädd för höjder, t. ex. på en balkong högt upp, ett utkikstorn eller en takterrass?
	1	Ja
		Anm.
34	0	Är Ni så rädd för att gå ut ensam att Ni måste ha någon i sällskap?
	1	Ja
		Anm.
35	0	Har Ni en känsla av att Ni har eller kommer att få någon allvarlig sjukdom, utan att läkare ställt diagnos om någon sådan?
	1	Ja
		Anm.
36	0	Känner Ni obehag inför något annat t. ex. att resa med buss eller spårvagn, att sitta innerst i en bänk på bio, att gå över broar, torg, etc.?
		Nej
		Om ja. Av vilket slag?
37	1	Hur tycker Ni själv att Ert minne fungerar?
	2	Bra
	3	Ganska bra
	4	Mindre bra
		Dåligt
		Anm.
38	0	Om 37:3 eller 4
		Tycker Ni att Ni lider av minnesrubbingar?
		Nej
		Om ja. På vad sätt?

39	0	Har Ni haft några krampanfall med medvetenlöshet? Nej <i>Gå över till fråga 41</i> <i>Om ja. Under vilka omständigheter?</i>
40		<i>Om 39: ja</i> När fick Ni senast ett sådant krampanfall? <i>Angiv ungefärlig tidpunkt</i>
41	0	Har Ni haft några andra svimningsanfall? Nej <i>Om ja. Under vilka omständigheter?</i>
42		<i>Om 41: ja</i> När svimmade Ni sist? <i>Angiv ungefärlig tidpunkt</i>
43	0 1 2 3	Besvärar Ni av huvudvärk? Nej <i>Gå över till fråga 47</i> <i>Om ja. Hur ofta?</i> Dagligen Någon eller några gånger i veckan Mera sällan Anm.
		<i>De följande frågorna 44—46 ställs endast om 43: ja</i>
44	0 1	<i>Om Ip är kvinna och född 1907 eller senare</i> Förvärras Er huvudvärk påtagligt vid menstruationen? Nej Ja Anm.
45	0 1	Lider Ni av anfallsvis påkommande huvudvärk, d.v.s. vad man kallar migrän? Nej Ja Anm.
46	1 2 3	Brukar 1 det kännas som ett band över pannan eller hjässan? 2 det kännas som ett tryck över eller i huvudet? 3 huvudvärken sitta i ena halvan av huvudet? huvudvärken yttra sig på något annat sätt? Hur? Anm.
47	0	Har Ni lätt för att få yrsel? Nej <i>Gå över till fråga 49</i> <i>Om ja. Under vilka omständigheter (t. ex. anfallsvis)</i>
48		<i>Om 47: ja</i> När fick Ni senast ett anfall av yrsel? <i>Angiv ungefärlig tidpunkt</i>

49	0	Har Ni på sista tiden lidit av aptitlöshet? Nej <i>Om ja. Av vilken anledning?</i>
50	0	Känner Ni Er ofta osäker på Er själv eller besvärad i andra människors sällskap? Nej <i>Om ja. Hur yttrar sig denna osäkerhet? Kan Ni ge några exempel på tillfällen eller situationer, då Ni känner Er besvärad och osäker?</i>
51	0 1	Har Ni en benägenhet att ta saker och ting hårt? Nej Ja Anm.
52	0	Känner Ni Er misstrodd och missförstådd i livet? Nej <i>Om ja. I vilket avseende?</i>
53	0 1	Har Ni svårt att hålla ut med en besvärlig arbetsuppgift? Nej Ja Anm.
54	0	Har Ni i övrigt något besvär eller symtom som inte framgått av föregående frågor? Nej <i>Om ja. Vilka?</i>
		<i>Följande frågor 55—58 ställs endast till lp, som anser sig själv lida av något slags besvär. Frågan ställs även i tveksamma fall.</i>
55	1 2 3 4	Hur länge har Ni haft de här besvären, som Ni har berättat om i denna intervju? Kortare tid än 1 månad Minst 1 månad men mindre än 1/2 år Minst 1/2 år men mindre än 1 år Minst 1 år Anm.
		<i>Om flera alternativ nämns notera endast längsta tiden</i>
56	0 1 2	<i>Om lp är kvinna och född 1907 eller senare</i> Påverkar menstruationen de här besvären? Nej, besvären påverkas inte av detta Ja, besvären uppträder endast i samband härmed Ja, besvären förvärras i samband härmed Anm.
57	0 1	<i>Om lp är kvinna och född 1900—1915</i> Anser Ni att de här besvären sammanhänger med övergångsåldern? Nej Ja Anm.

58		Läs upp alternativen. Markera endast ett svar Har symtomen
	1	varit så obetydliga att Ni inte brytt Er om dem i vanliga fall?
	2	varit tämligen besvärande?
	3	varit så svåra, att Ni knappast kunnat klara Ert dagliga arbete?
	4	varit så svåra, att Ni inte alls kunnat arbeta?
		Anm.
59		Har Ni under de senaste åren använt medicin (t. ex. tabletter)
	0	Nej Om ja. Har Ni
	1	använt medicin mer tillfälligt?
	2	medicinerat regelbundet under längre tid?
		Anm.
60		Om 59:1 eller 2 Har Ni
	1	blivit ordinerad medicin av läkare?
	2	själv köpt medicin utan läkarrecept?
		Anm.
61		Om 60:2 Har Ni missbrukat eller överdoserat medicinen?
	0	Nej
	1	Ja
		Anm.
62		Har det någonsin inträffat, att Ni sökt läkare för kroppsligt lidande men att läkaren inte kunnat finna något fel på Er?
	0	Nej Om ja. För vilka besvär sökte Ni? När ägde besöket (besöken) rum?
63		Har Ni någonsin sökt läkare för nervösa besvär?
	0	Nej Gå över till fråga 67
	1	Ja
		Anm.
64		Har Ni någonsin vårdats på sjukhus för nervösa besvär?
	0	Nej
	1	Ja
		Anm.
65		Frågorna 65 och 66 ställs endast om 63:1 eller 64:1 a) När ägde detta rum? b) Vilka nervösa besvär sökte Ni (vårdades Ni) för vid detta (dessa) tillfälle (tillfällen)?

66	1 2 3 4	Var den (de) läkare, som Ni då konsulterade provinsialläkare, distriktsläkare eller annan läkare, som inte är nerv-specialist? privatpraktiserande nervspecialist? läkare på psykiatrisk mottagning eller psykiatrisk poliklinik på sjukhus? läkare på annan mottagning eller poliklinik på sjukhus? annat? Vad?
67	0	Har Ni sedan den 1 januari 1955 vårdats på sjukhus? (ev. utöver vad som tidigare nämnts). Nej Om ja. På vilket (vilka) sjukhus?
68	0	Har Ni sedan den 1 januari 1955 vistats på vilohem eller liknande? Nej Om ja. På vilket (vilka) vilohem?
69	1 2 3 9	Har Ni sedan den 1 januari 1955 sökt hjälp på rådgivningsbyrå? sökt hjälp genom kurator? vänt Er till homeopat eller kiropraktiker? (Intet av detta) Gå över till fråga 72 Anm.
70		Om 69:1—3 Vad var anledningen till att Ni sökte hjälp vid detta (dessa) tillfälle (tillfällen)? 69:1 69:2 69:3
71	0	Har Ni sökt annan hjälp för nervösa besvär än vad som tidigare nämnts? Nej Om ja. Vilken annan hjälp?
72	0 1 2 3	Vi kommer nu till sista avsnittet i frågeformuläret och jag ställer först följande fråga: Anser Ni själv att Ni för närvarande behöver söka hjälp i någon form för nervösa besvär? Nej Gå över till fråga 78 Ja Tveksam (Erhåller för närvarande läkarvård) Anm.
73	1 2 3	De följande frågorna ställs endast för 72:1 och 2 Föredrar Ni i så fall att vända Er till en privatpraktiserande läkare som icke är psykiatriker eller nervspecialist? privatpraktiserande psykiatriker eller nervspecialist? läkare på psykiatrisk mottagning eller psykiatrisk poliklinik på sjukhus? Läs upp alternativen. Markera endast ett svar

	4	läkare på annan mottagning eller annan poliklinik på sjukhus? annan person eller institution? Vilken? Ip har ingen bestämd uppfattning Anm.
74	0 1 9	Har Ni behov att få kontakt med en kurator? Nej Ja Vet inte Anm.
75	0 1 9	Har Ni behov av att få kontakt med en rådgivningsbyrå? Nej Ja Vet inte Anm.
76	1 2 3 9	Tror Ni Er behöva vård på sjukhus eller vistelse på vilohem? Ja, vård på sjukhus Ja, vistelse på vilohem Ingendera Vet inte Anm.
77	0	Har Ni eljest några synpunkter på den hjälp, som Ni skulle behöva för Era nervösa besvär? Nej Om ja. Vilka synpunkter?
78	0	Ni fick ju ett förhandsmeddelande från institutet om den här intervjun. Har Ni fått kännedom om denna intervjuundersökning på något annat sätt? Nej Om ja. På vilket sätt?
79	1 2	Tycker Ni att undersökningar av det här slaget har någon betydelse? Ja Om nej. Varför inte?

INTERVJUDATA

1	1	Adressförändring inom orten: Avflyttad från orten. Ny adress: Okänd adress Oanträffbar av annan anledning. Vilken?
2	1 2 3 4	Ip bor i 1 enfamiljshus 2 tvåfamiljshus 3 radhus eller kedjehus 4 hyreshus Anm.
3	1 2 3	Ip vistas för närvarande 1 i bostaden 2 på hotell, vanligt pensionat el. dyl. 3 tillfälligt hos bekanta på sjukhus, anstalt, vilohem el. dyl. Vilken vårdanstalt? Annat. Vad?
4		Sökt utan att intervju kommit till stånd den / kl. den / kl. den / kl. den / kl. den / kl. den / kl.
5	1 1 2 3	Skedde intervjun hela tiden i enrum med Ip? 1 Ja Om nej. Beskriv intervjusituationen. Intervjun tilläts 1 utan övertalning 2 efter någon övertalning 3 endast efter mycken övertalning ej. Varför?
7	1 2 3	Ip:s inställning till intervjun före intervjun: 1 positiv 2 obestämd 3 negativ
8	1 2 3	Ip:s inställning till intervjun efter intervjun: 1 positiv 2 obestämd 3 negativ

Lokos anteckningar

.....

.....

.....

FÄLTUNDERSÖKNINGEN I HALLANDS LÄN ÅR 1957

*Tabeller utarbetade av
statistiska centralbyråns utredningsinstitut år 1957*

Tabell 2. Psykiskt sjuka i procent av hela befolkningen i Hallands län
(den 31.12 1950)

Ålder	Ogifta	Gifta	Frånskilda	Änklingar	Samtliga
<i>Män</i>					
0—10.....	—	—	—	—	—
10—20.....	0,01	—	—	—	0,01
20—30.....	0,4	0,03	—	—	0,3
30—40.....	1,3	0,1	2,2	3,2	0,5
40—50.....	3,5	0,2	8,0	—	1,1
50—60.....	6,1	0,3	6,6	0,7	1,6
60—70.....	6,4	0,5	3,5	0,4	1,7
70—W.....	7,5	0,7	11,3	1,1	2,0
Totalt	1,0	0,3	5,7	0,9	0,7
<i>Kvinnor</i>					
0—10.....	—	—	—	—	—
10—20.....	0,02	—	—	—	0,02
20—30.....	0,3	0,1	1,6	5,0	0,2
30—40.....	1,6	0,2	4,7	0,9	0,5
40—50.....	2,7	0,2	3,3	0,3	0,8
50—60.....	3,3	0,4	6,7	0,8	1,2
60—70.....	4,8	0,9	12,8	1,4	2,2
70—W.....	5,6	1,3	4,8	1,5	2,4
Totalt	0,9	0,4	5,8	1,3	0,7
<i>Samtliga</i>					
0—10.....	—	—	—	—	—
10—20.....	0,01	—	—	—	0,01
20—30.....	0,4	0,07	1,1	4,3	0,3
30—40.....	1,4	0,2	3,7	1,4	0,5
40—50.....	3,2	0,2	5,2	0,2	0,9
50—60.....	4,6	0,4	6,7	0,8	1,4
60—70.....	5,4	0,7	8,9	1,1	1,9
70—W.....	6,3	0,9	7,4	1,3	2,2
Totalt	1,0	0,3	5,8	1,2	0,7

Tabell 3. Psykiskt sjuka fördelade efter kön, ålder och kommuntyper

Kön, ålder	Städer, köpingar		Slättbygd		Blandad slätt- och skogsbygd		Skogsbygd		Norra Halland		Hela länet	
	N	n	N	n	N	n	N	n	N	n	N	n
<i>Män</i>												
Antal												
0—19....	9 603	—	3 303	—	6 519	—	1 801	1	3 426	—	24 652	1
20—39....	10 132	39	2 952	7	5 987	25	1 853	9	3 284	16	24 208	96
40—59....	8 225	94	2 710	32	5 694	78	1 664	34	3 001	38	21 294	276
60—W....	3 956	78	1 597	30	3 631	61	1 221	21	1 997	36	12 402	227
Summa	31 916	211	10 562	69	21 831	164	6 539	65	11 708	90	82 556	600
%												
0—19....	30,1	—	31,2	—	29,9	—	27,5	1,5	28,8	—	29,9	0,2
20—39....	31,7	18,5	27,9	10,1	27,4	15,2	28,3	13,8	27,6	17,8	29,3	17,0
40—59....	25,8	44,5	25,8	46,4	26,1	47,6	25,4	52,3	26,9	42,2	25,8	46,0
60—W....	12,4	37,0	15,1	43,5	16,6	37,2	18,7	32,3	16,8	40,0	15,0	37,8
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Kvinnor</i>												
Antal												
0—19....	9 411	—	3 071	1	6 321	1	1 651	—	3 146	—	23 700	2
20—39....	10 791	37	2 527	6	4 932	23	1 405	11	2 785	7	22 440	84
40—59....	8 992	81	2 443	17	5 294	64	1 503	21	2 777	23	21 009	206
60—W....	5 185	123	1 658	38	3 599	86	1 160	34	2 148	33	13 750	314
Summa	34 379	241	9 699	62	20 146	174	5 719	66	10 956	63	80 899	606
%												
0—19....	27,4	—	31,7	1,6	31,4	0,6	28,8	—	29,6	—	29,3	0,3
20—39....	31,4	15,4	26,1	9,7	24,5	13,2	24,5	16,7	25,4	11,1	27,7	13,9
40—59....	26,2	33,6	25,2	27,4	26,2	36,8	26,4	31,8	25,3	36,5	26,0	34,0
60—W....	15,1	51,0	17,1	61,3	17,9	49,4	20,3	51,5	19,6	52,4	17,0	51,8
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Anm. N = hela befolkningen i Hallands län 31/12 1950.

n = antal i undersökningen

Tabell 4. Psykiskt sjuka i procent av befolkningen inom olika åldrar och bebyggelse typer

Ålder	Städer, köpingar	Slättbygd	Skogs- bygd	Blandad slätt- och skogsbygd	Norra Halland	Hela länet
<i>Män</i>						
0—10.....	—	—	—	—	—	—
10—20.....	—	—	0,1	—	—	0,01
20—30.....	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
30—40.....	0,4	0,3	0,7	0,5	0,7	0,5
40—50.....	1,0	0,7	1,6	1,2	1,1	1,1
50—60.....	1,3	1,8	2,6	1,6	1,4	1,6
60—W.....	2,0	1,9	1,7	1,7	1,8	1,8
Totalt	0,7	0,7	1,0	0,8	0,8	0,7
<i>Kvinnor</i>						
0—10.....	—	—	—	—	—	—
10—20.....	—	0,1	—	0,03	—	0,02
20—30.....	0,1	0,2	0,6	0,4	0,3	0,2
30—40.....	0,6	0,3	0,9	0,6	0,2	0,5
40—50.....	0,8	0,4	1,3	0,8	0,8	0,8
50—60.....	1,1	1,1	1,5	1,6	0,9	1,2
60—W.....	2,4	2,3	2,9	2,4	1,5	2,3
Totalt	0,7	0,6	1,2	0,9	0,6	0,7
<i>Samtliga</i>						
0—10.....	—	—	—	—	—	—
10—20.....	—	0,04	0,1	0,02	—	0,01
20—30.....	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3
30—40.....	0,5	0,3	0,8	0,5	0,5	0,5
40—50.....	0,9	0,5	1,4	1,0	0,9	0,9
50—60.....	1,2	1,5	2,1	1,6	1,2	1,4
60—W.....	2,2	2,1	2,3	2,0	1,7	2,1
Totalt	0,7	0,7	1,1	0,8	0,7	0,7

Tabell 5. Psykiskt sjuka i Hallands län fördelade efter ålder och nuvarande vårdformer

Ålder	Vårdformer											S:a
	Mentalsjukh.		Fa- milje- vård	Vårdhem		Ålder- doms- hem	Kroni- ker- hem	Övriga sjuk- vårds- inrätt- ningar	I eget hem	Hos annan person	Öv- riga	
	S:ta Maria	Andra		för lätt- skötta sinnes- sjuka	En- skilda							
10—19....	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
20—29....	18	—	—	2	—	1	—	1	26	7	2	57
30—39....	49	2	—	8	—	2	—	2	46	12	2	123
40—49....	97	2	—	18	2	3	2	2	80	9	5	220
50—59....	132	—	—	36	1	6	2	1	64	15	5	262
60—69....	121	4	1	35	2	24	3	3	65	14	4	276
70—79....	73	—	1	43	5	22	1	2	31	7	1	186
80—89....	22	2	—	20	1	14	2	2	8	1	1	73
90—W....	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	6
Summa	514	10	2	164	11	74	10	13	323	65	20	1 206
Fördelning i %												
10—19....	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,3
20—29....	3,5	—	—	1,2	—	1,4	—	7,6	8,1	10,8	10,0	4,7
30—39....	9,6	20,0	—	4,9	—	2,7	—	15,4	14,2	18,5	10,0	10,2
40—49....	18,9	20,0	—	11,0	18,2	4,1	20,0	15,4	24,8	13,8	25,0	18,2
50—59....	25,7	—	—	22,0	9,1	8,1	20,0	7,6	19,8	23,1	25,0	21,7
60—69....	23,5	40,0	50,0	21,3	18,2	32,4	30,0	23,1	20,1	21,5	20,0	22,9
70—79....	14,2	—	50,0	26,2	45,4	29,7	10,0	15,4	9,6	10,8	5,0	15,4
80—89....	4,3	20,0	—	12,2	9,1	18,9	20,0	15,4	2,5	1,5	5,0	6,1
90—W....	0,2	—	—	1,2	—	2,7	—	—	0,3	—	—	0,5
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabell 6. Försöksutskrivna från mentalsjukhus och exspektanter fördelade efter nuvarande vårdformer

Vårdformer	Patientkategorier							
	Försöksutskrivna				Exspektanter (endast från S:ta Maria)		Samtliga	
	från S:ta Maria		från annat sjukhus					
	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%
Vårdhem för lättskötta sinnes- sjuka.....	83	41,9	—	—	6	35,3	89	41,2
Enskilt vårdhem.....	4	2,0	—	—	—	—	4	1,9
Ålderdomshem.....	10	5,1	—	—	5	29,4	15	6,9
Kronikerhem.....	2	1,0	—	—	1	5,9	3	1,4
Övriga sjukvårdsanstalter.....	3	1,5	—	—	—	—	3	1,4
Vistas i eget hem.....	68	34,3	1	100,0	4	23,5	72	33,3
Vistas hos annan person.....	16	8,1	—	—	1	5,9	17	7,9
Övriga.....	12	6,1	—	—	—	—	12	5,6
Summa	198	100,0	1	100,0	17	100,0	216	100,0

Tabell 7. Psykiskt sjuka i Hallands län fördelade efter diagnoser och ålder

Diagnoser	Ålder										Därav kvinnor
	10—19	20—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—89	90—W	Samtl.	
Manisk-depr. sjukdom . . .	—	4	5	12	16	24	16	2	—	79	59
Schizofreni . .	2	32	83	148	170	155	83	28	2	703	331
Paranoia	—	—	—	1	—	4	2	—	—	7	4
Epileptisk psykos	1	6	4	14	12	5	1	—	—	43	17
Insania pre-senilis	—	—	—	1	12	45	20	3	—	81	60
Insania senilis	—	—	—	—	—	6	37	27	3	73	50
Psychos. ex arteriosclerose	—	—	—	—	1	4	13	9	1	28	13
Psychos. e lesion cerebri .	—	1	5	7	18	12	5	2	—	50	14
Luetiska psykoser . . .	—	—	1	—	3	2	3	—	—	9	2
Psychos. ex infectione . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Psychos. alcoholica	—	1	—	4	1	—	—	—	—	6	—
Alcoholismus	—	—	5	3	3	—	1	—	—	12	1
Narcomania	—	—	—	3	2	—	—	—	—	5	—
Psyko-gen psykos	—	—	6	6	3	1	2	—	—	18	7
Psykopathia	—	8	10	10	8	5	2	—	—	43	14
Psykoneuros	—	2	3	6	8	7	1	—	—	27	21
Övriga	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3
Debilitas	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Imbecillitas	—	2	—	1	2	2	—	—	—	7	5
Uppgift saknas	—	1	1	2	3	2	—	1	—	10	4
Summa	3	57	123	220	262	276	186	73	6	1 206	606

Tabell 8. Procentuell fördelning av diagnosgrupper inom åldersgrupper

Diagnoser	Ålder									Därav kvinnor
	10—19	20—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—W	Samtl.	
Manisk-depr. sjukdom	—	7,0	4,1	5,4	6,1	8,7	8,6	2,5	6,6	9,7
Schizofreni	66,7	56,1	67,5	67,3	64,9	56,2	44,6	38,0	58,3	54,6
Paranoia	—	—	—	0,4	—	1,5	1,1	—	0,6	0,7
Epileptisk psykos	33,3	10,5	3,2	6,4	4,6	1,8	0,5	—	3,6	2,8
Insania presenilis	—	—	—	0,4	4,6	16,3	10,8	3,8	6,7	9,9
Insania senilis	—	—	—	—	—	2,2	19,9	38,0	6,1	8,2
Psychos. ex arteriosclerose	—	—	—	—	0,4	1,5	7,0	12,6	2,3	2,1
Psychos. e lesion cerebri	—	1,8	4,1	3,2	6,9	4,3	2,7	2,5	4,1	2,3
Luetiska psykos	—	—	0,8	—	1,1	0,7	1,6	—	0,7	0,3
Psychos. ex infectione	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,1	0,2
Psychos. alcoholica	—	1,8	—	1,8	0,4	—	—	—	0,5	—
Alcoholismus	—	—	4,1	1,4	1,1	—	0,5	—	1,0	0,2
Narcomania	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	0,4	—
Psyko-gen psykos	—	—	4,9	2,7	1,1	0,4	1,1	—	1,5	1,2
Psykopathia	—	14,0	8,1	4,5	3,1	1,8	1,1	—	3,6	2,3
Psykoneuros	—	3,5	2,4	2,7	3,0	2,5	0,5	—	2,2	3,5
Övriga	—	—	—	—	—	0,7	—	1,3	0,2	0,5
Debilitas	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,1	—
Imbecillitas	—	3,5	—	0,5	0,8	0,7	—	—	0,6	0,8
Uppgift saknas	—	1,8	0,8	0,9	1,1	0,7	—	1,3	0,8	0,7
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabell 9. Procentuell fördelning av åldersgrupper inom diagnosgrupper

Diagnoser	Ålder									Därav kvinnor
	10—19	20—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—89	90—W	Samtl.
Manisk-depr. sjukdom	—	5,0	6,3	15,3	20,3	30,4	20,3	2,5	2,5	100,0
Schizofreni	0,3	4,5	11,8	21,1	24,0	22,0	11,8	4,0	0,3	100,0
Epileptisk psykos	2,3	14,0	9,3	32,6	27,9	11,6	2,3	—	—	100,0
Insania presenilis	—	—	—	1,2	14,8	55,6	24,7	3,7	—	100,0
Insania senilis	—	—	—	—	—	8,2	50,7	37,0	4,1	100,0
Psychos. ex arteriosclerose	—	—	—	—	3,6	14,3	46,4	32,1	3,6	100,0
Psychos. e lesion cerebri	—	2,0	10,0	14,0	36,0	24,0	10,0	4,0	—	100,0
Psykopathia	—	18,6	23,3	23,3	18,6	11,6	4,6	—	—	100,0
Psykoneuros	—	7,4	11,1	22,2	29,7	25,9	3,7	—	—	100,0
Totalt	0,2	4,7	10,2	18,2	21,8	22,9	15,4	6,1	0,5	100,0

Tabell. 10. Vårdtid vid sista vårdtillfället för på mentalsjukhus intagna, efter diagnoser

Diagnoser	Vårdtider							Summa
	0—2 mån.	2—6 mån.	6—12 mån.	1—2 år	2—5 år	5—10 år	10 år och däröver	
Manisk-depr. sjukdom	2	4	4	3	2	—	1	16
Schizofreni	7	22	15	21	34	41	258	398
Epileptisk psykos	—	2	1	2	4	—	3	12
Insania presenilis	2	5	4	4	1	6	4	26
Insania senilis	2	3	—	3	7	3	2	20
Psychos. ex arteriosclerose	1	—	—	1	—	2	—	4
Psychos. e lesione	2	1	1	2	2	3	3	14
Luetiska psykoser	—	—	—	—	—	1	1	2
Psychos. alcoholica	—	1	—	—	—	—	—	1
Alcoholismus	3	—	—	—	—	—	—	3
Psyksen psykos	1	—	—	2	—	—	—	3
Psykopathia	2	5	1	4	—	1	—	13
Psykoneuros	—	1	—	—	—	—	—	1
Debilitas	—	—	—	—	1	—	—	1
Imbecillitas	1	—	—	2	1	—	2	6
Uppgift saknas	—	—	—	1	—	1	2	4
Summa	23	44	26	45	52	58	276	524

Tabell 11. Psykiskt sjuka fördelade efter diagnoser och nuvarande vårdformer

Diagnoser	Vårdformer											S:a
	Mentalsjukh.		Fa- milje- vård	Vårdhem		Ålder- doms- hem	Kroni- ker- hem	Övriga sjuk- vårds- inrätt- ningar	I eget hem	Hos annan person	Öv- riga	
	S:ta Maria	Andra		för lätt- skötta sinnes- sjuka	En- skilda							
Manisk-depr. sjukdom	16	—	—	7	3	5	—	2	38	7	1	79
Schizofreni	391	7	—	105	4	33	1	2	116	34	10	703
Paranoia	—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—	7
Epileptisk psykos	12	—	—	1	—	—	—	1	21	6	2	43
Insania presenilis	26	—	—	17	—	6	—	—	29	3	—	81
Insania senilis	19	1	—	12	2	14	3	2	18	2	—	73
Psychos. ex arter- iosclerose	4	—	—	4	1	7	3	—	9	—	—	28
Psychos. e lesione	13	1	—	7	—	3	3	1	20	—	2	50
Luetiska psykoser	2	—	—	2	—	1	—	—	3	1	—	9
Psychos. ex infec- tione	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Psychos.alcoholica	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	6
Alcoholismus	3	—	—	—	—	—	—	1	4	2	2	12
Narcomania	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	5
Psyksen psykos	3	—	—	—	—	—	—	—	11	4	—	18
Psykopathia	13	—	—	2	1	2	—	—	18	4	3	43
Psykoneuros	1	—	1	—	—	—	—	2	22	1	—	27
Övriga	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3
Debilitas	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Imbecillitas	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
Uppgift saknas	3	1	—	2	—	1	—	1	2	—	—	10
Summa	514	10	2	164	11	74	10	13	323	65	20	1 206

Tabell 13. Psykiskt sjuka med procentuell fördelning av nuvarande vårdformer inom diagnosgrupper

Diagnoser	Vårdformer											S:a
	Mentalsjukh.		Fa- milje- vård	Vårdhem		Ålder- doms- hem	Kro- niker- hem	Övriga sjuk- vårds- inrätt- ningar	I eget hem	Hos annan person	Öv- riga	
	S:ta Maria	Annat		för lätt- skötta sinnes- sjuka	En- skilt							
Manisk-depr. sjukdom	20,3	—	—	8,9	3,8	6,3	—	2,5	48,1	8,9	1,2	100
Schizofreni	55,6	1,0	—	14,9	0,6	4,7	0,1	0,3	16,5	4,8	1,5	100
Epileptisk psykos	27,9	—	—	2,3	—	—	—	2,3	48,8	14,0	4,7	100
Insania presenilis	32,1	—	—	21,0	—	7,4	—	—	35,8	3,7	—	100
Insania senilis ...	26,0	1,4	—	16,4	2,8	19,2	4,1	2,7	24,7	2,7	—	100
Psychos. ex arter- iosclerose	14,3	—	—	14,3	3,6	25,0	10,7	—	32,1	—	—	100
Psychos. e lesionē.	26,0	2,0	—	14,0	—	6,0	6,0	2,0	40,0	—	4,0	100
Psychopathia	30,2	—	—	4,7	2,3	4,7	—	—	41,9	9,3	7,0	100
Psykoneuros.	3,7	—	3,7	—	—	—	—	7,4	81,5	3,7	—	100
Totalt	42,6	0,8	1,7	13,6	0,9	6,1	0,8	1,1	26,8	5,4	1,7	100

Tabell 14. Psykiskt sjuka fördelade efter diagnoser och vårdtekniska faktorer

Diagnoser	Säng- läge	Osnygghet			Straffri	Blind	Dövstum
		1	2	3			
Manisk-depr. sjukdom . . .	8	1	—	—	—	—	—
Schizofreni	63	30	18	3	12	—	2
Paranoia	1	—	—	—	—	—	—
Epileptisk psykos	2	1	1	—	—	—	—
Insania presenilis	13	1	2	1	—	—	—
Insania senilis	16	11	3	1	3	—	—
Psychos. ex arteriosclerose	8	2	—	—	2	—	—
Psychos. e lesione cerebri.	9	3	3	—	1	—	—
Psychogen psykos	1	—	—	—	—	—	—
Psychopathia	2	—	—	—	7	—	—
Psychoneuros	2	—	—	—	—	—	—
Imbecillitas	1	1	—	—	—	—	—
Uppgift saknas	1	1	—	—	—	1	—
Summa	128	51	27	5	25	1	2

Tabell 15. Psykiskt sjuka fördelade efter diagnoser och pågående medicinsk behandling

Diagnoser	Ingen medicinsk behandling	Insulincoma	Annan insulinbehandling	Elchock	Hiberna, serpasil	Lobotomerad	Annan behandling	Uppgift saknas	S:a
Manisk-depr. sjukdom	64	—	—	2	12	—	1	—	79
Schizofreni	475	8	—	2	213	1	2	2	703
Paranoia	7	—	—	—	—	—	—	—	7
Epileptisk psykos	17	1	—	—	3	—	21	—	43
Insania presentilis	65	—	—	1	13	—	2	—	81
Insania senilis	64	—	—	—	8	—	1	—	73
Psychos. ex arteriosclerose . .	24	—	—	—	3	—	1	—	28
Psychos. e lesione cerebri	40	—	1	1	5	—	3	—	50
Luetiska psykos	9	—	—	—	—	—	—	—	9
Psychos. ex infectione	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Psychos. alcoholica	5	—	—	—	1	—	—	—	6
Alcoholismus	8	—	3	—	—	—	1	—	12
Narcomania	4	—	—	—	—	—	1	—	5
Psykogen psykos	15	1	—	—	—	—	2	—	18
Psykopathia	37	1	1	—	1	—	1	2	43
Psykoneuros	25	—	1	—	—	—	1	—	27
Övriga	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Debilitas	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Imbecillitas	4	—	—	1	2	—	—	—	7
Uppgift sakn.	7	—	—	—	1	—	1	1	10
Summa	873	11	6	7	263	1	39	6	1 206

Anm. Psykoterapi finnes redovisad i 7 fall (frågan ej besvarad i 6 fall). Därav behandlades 3 patienter med schizofreni och 1 med psykogen psykos med individuell psykoterapi. Övriga 3 fall var samtliga schizofrena och behandlades med rörelseterapi. Ingen uppgift om pågående gruppterapi.

Tabell 16. Psykiskt sjuka fördelade efter diagnoser och pågående arbets- och sysselsättningsterapi

Diagnoser	Ingen sysselsättning	Sysselsättning på avd.	Städning m. m. på avd.	Arbets-terapi-avd.	Kök, drifts-verk-städer	Träd-gård, park	Arbete utanför sjuk-huset	Uppgift saknas	S:a
Manisk-depr. sjukdom	18	6	9	—	3	3	40	—	79
Schizofreni	226	96	89	50	33	46	158	5	703
Paranoia	2	—	1	—	1	1	2	—	7
Epileptisk psykos	7	5	1	1	2	—	27	—	43
Insania pre-senilis	23	10	15	1	1	1	30	—	81
Insania senilis	38	10	2	1	—	—	22	—	73
Psychos. ex arteriosclerose	13	3	1	1	—	—	10	—	28
Psychos. e lesione cerebri	19	5	4	1	—	—	21	—	50
Luetiska psykos	1	2	1	—	1	1	3	—	9
Psychos. ex infectione	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Psychos. alcoholica	1	—	—	—	1	—	4	—	6
Alcoholismus	3	—	—	—	—	—	9	—	12
Narcomania	1	—	—	—	—	—	4	—	5
Psykogen psykos	3	—	1	—	1	—	13	—	18
Psykopathia	5	2	3	1	4	3	24	1	43
Psykoneuros	4	2	—	—	—	—	21	—	27
Övriga	1	—	—	—	—	—	2	—	3
Debicillitas	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Imbecillitas	1	3	—	2	—	—	1	—	7
Uppgift saknas	4	2	1	1	—	—	1	1	10
Summa	370	147	128	59	48	55	392	7	1 206

Tabell 17. Psykiskt sjuka fördelade efter diagnoser och definitiva vårdformer

Diagnoser	Definitiv vårdform											S:a
	Mental-sjukhus	Vård-hem för lätt-skötta sinnessjuka	Fam-lilje-vård	Ålder-doms-hem	Kroni-ker-hem	Eget hem		Vistelse hos annan		Ej klassi-ficer-bara	Upp-gift sak-nas	
						utan	med	utan	med			
Manisk-depr. sjukdom.....	19	11	—	5	—	22	15	2	4	1	—	79
Schizofreni.....	314	205	4	30	1	34	76	8	29	2	—	703
Paranoia.....	1	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7
Epileptisk psykos	9	1	—	—	—	6	18	2	6	1	—	43
Insania prese-nilis.....	30	21	—	3	—	12	13	2	—	—	—	81
Insania senilis ..	27	20	1	9	1	1	12	—	—	1	1	73
Psychos. ex ar-teriosclerose ..	6	4	—	10	3	—	5	—	—	—	—	28
Psychos. e lesione cerebri.....	9	9	—	6	7	10	8	1	—	—	—	50
Luetiska psy-koser.....	2	3	—	—	—	—	2	—	2	—	—	9
Psychos. ex infec-tione.....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Psychos. alco-holica.....	2	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	6
Alcoholismus ...	4	—	—	—	—	1	3	—	1	3	—	12
Narcomania....	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5
Psykogen psykos	2	—	—	—	—	13	1	1	1	—	—	18
Psykopathia....	5	3	—	1	—	6	17	1	6	3	1	43
Psykoneuros....	—	—	—	—	—	25	—	1	—	—	1	27
Övriga.....	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3
Debilitas	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Imbecillitas	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
Uppgift saknas .	4	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	10
Summa	443	286	6	66	12	132	176	18	50	12	5	1 206

Tabell 18. Procentuell fördelning av diagnosgrupper på definitiva vårdformer

Diagnoser	Definitiv vårdform											
	Mental-sjukhus	Vårdhem för lätt-skötta sinnessjuka	Fam-ljevård	Ålderdomshem	Kronikerhem	Eget hem		Vistelse hos annan		Ej klassificerbara	Uppgift saknas	S:a
						utan	med	utan	med			
Manisk-depr. sjukdom	24,1	13,9	—	6,3	—	27,8	19,0	2,5	5,1	1,3	—	100,0
Schizofreni	44,7	29,2	0,6	4,3	0,1	4,8	10,8	1,1	4,1	0,3	—	100,0
Paranoia	14,3	71,4	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	100,0
Epileptisk psykos	20,9	2,3	—	—	—	14,0	41,9	4,6	14,0	2,3	—	100,0
Insania pre-senilis	37,0	25,9	—	3,7	—	14,8	16,1	2,5	—	—	—	100,0
Insania senilis	37,0	27,4	1,4	12,3	1,4	1,4	16,4	—	—	1,4	1,3	100,0
Psychos. ex arteriosclerose	21,4	14,3	—	35,7	10,7	—	17,9	—	—	—	—	100,0
Psychos. e lesion cerebri	18,0	18,0	—	12,0	14,0	20,0	16,0	2,0	—	—	—	100,0
Luetiska psykoser	22,2	33,4	—	—	—	—	22,2	—	22,2	—	—	100,0
Psychos. ex infectione	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	100,0
Psychos. alcoholica	33,3	—	—	—	—	—	50,0	—	16,7	—	—	100,0
Alcoholismus	33,4	—	—	—	—	8,3	25,0	—	8,3	25,0	—	100,0
Narcomania	60,0	20,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	100,0
Psykogen psykos	11,1	—	—	—	—	72,2	5,6	5,6	5,5	—	—	100,0
Psykopathia	11,6	7,0	—	2,3	—	14,0	39,5	2,3	14,0	7,0	2,3	100,0
Psykoneuros	—	—	—	—	—	92,6	—	3,7	—	—	3,7	100,0
Övriga	—	—	—	33,3	—	33,3	33,4	—	—	—	—	100,0
Debilitas	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0
Imbecillitas	71,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	100,0
Uppgift saknas..	40,0	20,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,0	100,0
Summa	36,7	23,7	0,5	5,5	1,0	10,9	14,6	1,5	4,2	1,0	0,4	100,0

Tabell 19. Psykiskt sjuka fördelade efter nuvarande och föreslagna (definitiva) vårdformer

Nuvarande vårdform	Definitiv vårdform									S:a	
	Men- tal- sjuk- hus	Vård- hem	Fa- milje- vård	Ålder- doms- hem	Kroni- ker- hem	I eget hem		Hos annan			Ej kod- bar
						utan	med	utan	med		
S:ta Maria	344	93	4	4	—	27	8	14	14	6	514
Annat mentalsjukhus. . .	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10
Vårdhem för lättskötta sinnessjuka.	1	160	—	1	1	1	—	—	—	—	164
Enskilt vårdhem.	—	5	—	3	—	1	—	1	—	1	11
Ålderdomshem.	10	6	1	53	—	1	1	—	1	1	74
Kronikerhem.	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	10
Annan sjukvårdsinrätt- ning.	2	3	—	—	1	2	—	—	1	4	13
I eget hem.	63	6	—	3	1	93	155	—	1	3	325
Hos annan person.	10	2	—	1	—	6	12	3	31	—	65
Övriga	2	10	—	1	2	1	—	—	2	2	20
Summa	443	286	6	66	12	132	176	18	50	17	1 206
Fördelning i %											
S:ta Maria.	66,9	18,1	0,8	0,8	—	5,3	1,6	2,7	2,7	1,2	100,0
Annat mentalsjukhus. . .	80,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	100,0
Vårdhem för lättskötta sinnessjuka.	0,6	97,6	—	0,6	0,6	0,6	—	—	—	—	100,0
Enskilt vårdhem.	—	45,5	—	27,3	—	9,1	—	9,1	—	9,1	100,0
Ålderdomshem.	13,5	8,1	1,4	71,6	—	1,4	1,4	—	1,4	1,4	100,0
Kronikerhem.	30,0	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	100,0
Annan sjukvårdsinrätt- ning.	15,4	23,1	—	—	7,7	15,4	—	—	7,7	30,8	100,0
I eget hem.	19,4	1,8	—	0,9	0,3	28,6	47,7	—	0,3	0,9	100,0
Hos annan person.	15,4	3,1	—	1,5	—	9,2	18,5	4,6	47,7	—	100,0
Övriga.	10,0	50,0	—	5,0	10,0	5,0	—	—	10,0	10,0	100,0
Summa	36,7	23,7	0,5	5,5	1,0	10,9	14,6	1,5	4,2	1,4	100,0

Tabell 20. Psykiskt sjuka intagna på mentalsjukhus och vårdhem fördelade efter diagnoser och pågående medicinsk behandling

Diagnoser	Pågående behandling								S:a
	Ingen medicinsk behandling	In-sulin coma	Annan in-sulin-behandling	El-chock	Hiberna, ser-pasil	Lobotome-rad	Annan be-handling	Uppgift saknas	
<i>Intagna på mentalsjukhus</i>									
Manisk-depr. sjukdom....	11	—	—	2	3	—	—	—	16
Schizofreni.....	203	8	—	2	185	—	—	—	398
Epileptisk psykos.....	8	1	—	—	2	—	1	—	12
Insania presenilis.....	16	—	—	1	9	—	—	—	26
Insania senilis.....	14	—	—	—	6	—	—	—	20
Psychos. ex arteriosclerose	3	—	—	—	1	—	—	—	4
Psychos. e lesione cerebri.	7	—	1	1	4	—	1	—	14
Luetiska psykoser.....	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Psychos. alcoholica.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Alcoholismus.....	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Psykogen psykos.....	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Psykopathia.....	10	1	1	—	1	—	—	—	13
Psykoneuros.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Debilitas.....	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Imbecillitas.....	3	—	—	1	2	—	—	—	6
Uppgift saknas.....	2	—	—	—	1	—	—	1	4
Summa	283	11	5	7	215	—	2	1	524
<i>Intagna på vårdhem</i>									
Manisk-depr. sjukdom....	5	—	—	—	5	—	—	—	10
Schizofreni.....	97	—	—	—	10	—	—	2	109
Paranoia.....	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Epileptisk psykos.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Insania presenilis.....	14	—	—	—	3	—	—	—	17
Insania senilis.....	13	—	—	—	—	—	—	—	13
Psychos. ex arteriosclerose	4	—	—	—	2	—	—	—	6
Psychos. e lesione.....	7	—	—	—	—	—	—	—	7
Luetiska psykoser.....	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Psykopathia.....	2	—	—	—	—	—	—	1	3
Uppgift saknas.....	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Summa	152	—	—	—	20	—	—	3	175
Summa på mentalsjukhus och vårdhem	435	11	5	7	235	—	2	4	699
S:a övriga fall	438	—	1	—	28	1	37	2	507
Psykiskt sjuka i allt	873	11	6	7	263	1	39	6	1 206

Tabell 21. Psykiskt sjuka fördelade efter nuvarande vårdformer och behov av ytterligare behandling

Nuvarande vårdform	Intet ytterligare vårdbehov	Behov av ytterligare behandling				Arbetsför	Uppgift saknas	Summa
		inom nuvarande vårdform	som akut vårdfall	å psyk. lasarettss-avd.	annan behandling			
Mentalsjukhus .	273	247	1	1	1	—	1	524
Vårdhem	32	141	1	1	—	—	—	175
Övr. anstalter .	9	65	14	2	7	—	—	97
Ej intagna	76	85	79	28	138	2	2	410
Summa	390	538	95	32	146	2	3	1 206
<i>Fördelningar i %</i>								
Mentalsjukhus .	22,6	20,5	0,1	0,1	0,1	—	0,1	43,4
Vårdhem	2,7	11,7	0,1	0,1	—	—	—	14,5
Övr. anstalter .	0,7	5,4	1,2	0,2	0,6	—	—	8,0
Ej intagna	6,3	7,9	6,6	2,3	11,4	0,2	0,2	34,0
	32,3	44,6	7,9	2,7	12,1	0,2	0,2	100,0
Mentalsjukhus .	52,1	47,1	0,2	0,2	0,2	—	0,2	100,0
Vårdhem	18,3	80,6	0,6	0,6	—	—	—	100,0
Övr. anstalter .	9,3	67,0	14,4	2,1	7,2	—	—	100,0
Ej intagna	18,5	20,7	19,3	6,8	33,7	0,5	0,5	100,0
	32,3	44,6	7,9	2,7	12,1	0,2	0,2	100,0
Mentalsjukhus .	70,0	45,9	1,1	3,1	0,7	—	33,3	43,4
Vårdhem	8,2	26,2	1,1	3,1	—	—	—	14,5
Övr. anstalter .	2,3	12,1	14,7	6,3	4,8	—	—	8,0
Ej intagna	19,5	15,8	83,2	87,5	94,5	100,0	67,7	34,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Anm. Den första procentfördelningen är beräknad efter totalantalet psykiskt sjuka, den andra efter nuvarande vårdformer och den tredje efter behovet av ytterligare behandling.

Fördelning i %													
Insulincoma, sysselsatta...	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,7
» , ej sysselsatta	0,1	0,7	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,9
Annan insulinbehandl., ej sysselsatta	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,7
Elchock, sysselsatta	—	0,9	—	—	0,1	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0
Hibernal o.d., sysselsatta ..	0,9	20,5	—	—	—	0,1	—	—	21,5	—	—	0,1	23,3
Hibernal o.d., sysselsatta	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3
psykoterapi.	—	8,7	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	10,0
Hibernal o.d., ej sysselsatta	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3
Annan behandl., sysselsatta	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1
Psykoterapi, sysselsatta...	0,1	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2,3	7,9	—	32,8
Endast sysselsatta.....	20,7	1,6	0,1	—	—	—	—	0,1	17,7	2,0	9,2	—	29,0
Ej sysselsatta.....	16,7	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,4	—	0,9
Uppgift saknas	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	39,1	35,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	75,0	4,5	20,2	0,1	100,0
Därav sysselsatta	21,8	24,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	46,5	2,3	9,6	—	58,5
» ej sysselsatta	17,2	11,2	—	—	—	—	—	—	42,6	2,0	10,3	0,1	40,6

Tabell 23. Psykiskt sjuka fördelade efter föreslagna vårdformer och kön

Definitiv vårdform	Antal			%		
	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa
Mentalsjukhus.....	208	235	443	34,7	38,8	36,7
Vårdhem för lättskötta sinnessjuka.....	148	138	286	24,7	22,8	23,7
Familjevård.....	4	2	6	0,7	0,3	0,5
Ålderdomshem.....	34	32	66	5,7	5,3	5,5
Kronikerhem.....	4	8	12	0,7	1,3	1,0
Eget hem utan övervakning	58	74	132	9,7	12,2	10,9
» » med »	101	75	176	16,8	12,4	14,6
Hos annan utan »	10	8	18	1,7	1,3	1,5
» » med »	23	27	50	3,8	4,5	4,2
Övriga.....	10	7	17	1,7	1,2	1,4
Summa	600	606	1 206	100,0	100,0	100,0

Tabell 24. Psykiskt sjuka fördelade efter hallandslasarettens upptagningsområden och definitiva vårdformer

Upptagningsområden	Definitiv vårdform										S:a
	Mental-sjukhus	Vårdhem	Familmjevård	Ålderdomshem	Kronikerhem	Eget hem		Hos annan		Ej kodbar	
						utan	med	utan	med		
						övervakning		övervakning			
Halmstads centrallasarett	211	138	3	27	7	91	80	9	21	12	599
Falkenbergs lasarett.....	88	60	1	9	1	19	26	4	9	2	219
Varbergs lasarett	144	88	2	30	4	22	70	5	20	3	388
Hela länet	443	286	6	66	12	132	176	18	50	17	1 206
Fördelningar i %											
Halmstads centrallasarett	35,2	23,0	0,5	4,5	1,2	15,2	13,4	3,2	3,5	2,0	100,0
Falkenbergs lasarett.....	40,2	27,4	0,5	4,1	0,5	8,7	11,9	1,8	4,1	0,9	100,0
Varbergs lasarett	41,0	25,1	0,6	8,5	1,1	6,3	20,5	1,4	5,7	0,9	100,0
Hela länet	36,7	23,7	0,5	5,5	1,0	10,9	14,6	1,5	4,2	1,4	100,0
Halmstads centrallasarett	47,6	48,3	50,0	40,9	58,3	68,9	45,5	50,0	42,0	70,6	49,6
Falkenbergs lasarett.....	19,9	21,0	16,7	13,6	8,3	14,4	14,8	22,2	18,0	11,8	18,2
Varbergs lasarett.....	32,5	30,8	33,3	45,5	33,3	16,7	39,8	27,8	50,0	17,6	32,2
Hela länet	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Statens offentliga utredningar 1958

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen.)

Allmän lagstiftning. Rättsskipning. Fångvård.

Häradsrätts sammansättning i brottmål. [9]
Förslag till varumärkeslag. [10]
Betänkande med förslag till allmän tjänstepliktslag m. m. [16]
Förslag till förenklingar i vissa delar av aktiebolagslagen. [27]

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning.

Utredning om vissa förhållanden vid konserveringsforskningsinstitutet. [3]
Författningsutredningen. 1. Kandidatnominering vid andrakammarval. [6] 2. Regeringsarbetet. [14] 3. Majoritetsval. Valstatistiska undersökningar. [29]

Kommunalförvaltning.

Statens och kommunernas finansväsen.

Förlust- och resultatutjämning. [35]

Politi.

Socialpolis och kvinnlig polis. [34]

Nationalekonomi och socialpolitik.

Socialförsäkring och rehabilitering. [17]
Reviderad nationalbudget för år 1958. [28]
Nettoprisindex. [36]
Statsbidrag till anordnande av skolmältider. [37]

Hälso- och sjukvård.

Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning. [8]
Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena. [15]
Mentalsjukvårdsdelegationen. 2. Behandlingshem och mentalsjukhem för barn och ungdomar. [20]
3. Mentalsjukvårdens nydaning. [38] 4. Tabellbilaga till betänkande 3. [39]
Sjukreseersättningar. [23]
Regionsjukvården. [26]

Allmänt näringsväsen.

Gotland. [18]
Tornedalsutredningen. [22]

Fast egendom. Jordbruk med binärningar.

Småbrukarstödet. [7]
Bättre matpotatis. [24]

Vattenväsen. Skogsbruk. Bergsbruk.

Skogsvården å enskilda skogar. [30]

Industri.

Handel och sjöfart.

Kommunikationsväsen.

Vägplan för Sverige. Del 1. Riktlinjer och förslag samt kartbilagor. [1] Del 2. Expertutredningar och övriga textbilagor. [2]

Bank-, kredit- och penningväsen.

Försäkringsväsen.

Promemoria med förslag om fondförvaltning m. m. i samband med en utbyggd pensionering. [4]
Permanent skördeskadeskydd. [5]

Kyrkoväsen. Undervisningsväsen. Andlig odling i övrigt.

1955 års universitetsutredning. 3. Reserverna för högre utbildning. Beräkningar och metoddiskussion. [11] 4. Lärarbrist och läraröverskott. [21] 5. Forskningens villkor och behov. [32]
Supplement nr 9 till Sveriges familjenamn 1920. [19]
Ändrad utbildning av tandtekniker. [25]
Sjöbefälsutbildningens organisation m. m. [33]

Försvarsväsen.

Civilt försvarsutbildningen. [12]
Civilt försvarets organisation. [13]

Utrikes ärenden. Internationell rätt.

Nordiskt ekonomiskt samarbete [31]

DISTRIBUERAS AV
NORDISKA BOKHANDELN

Pris kr 3:—