

Priskurant

(utan förbindelse)

för

säsongen 189

Gödningsämnen.

	fosfor- syra	i vatten löslig fosfor- syra	qväfvä	kali	pris pr 85 kg	pris pr 100 kg
	‰	‰	‰	‰		
20 ‰ Superfosfat	—	20	—	—		
18 ‰ d:o	—	18	—	—		
10 ‰ d:o	—	10	—	—		
Thomasfosfat	17	—	—	—		
d:o	15-16	—	—	—		
Bennjöl Schlaffhorsts ångpr:	27-30	—	2-2 ¹ / ₂	—		
Femfaldt Concentreradt kali salt	—	—	—	47-50		
Svafvelsyrad kali Magnesia	—	—	—	15-18		
Kainit	—	—	—	12-14		
Svenskt kali	—	—	—	12		
Halftorr Fiskguano	2	—	3-4	—		
Torr Oblandad d:o	4-7	—	7-8	1		
Torr Kali d:o	10	—	4-5	7-8		
Torr Fältspats d:o	5	—	3	5		
Fisksuperfosfat	—	—	—	—		
Kali Amoniak superfosfat	—	6	4	6-8		
Mossgödnig	—	5	—	8-9		

1 ‰ analysningsfelellum förbehålles

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Linfrömjöl

Stenkol, Cokes, Antracitkol, Spannmål, Klöfver-, Gräs- och Rotfruktsfrö, Trävaror, Tortströ och Torfmull, Mejeripreparater och Specierier försäljes till billigaste priser.

Spannmål, Gräsfrö och Trävaror uppköpes.

Falkenberg i 189



HARRY HALLBERG.

Falkenberg, N. Larsons boktr., 1890.

Priskurant

(utan förbindelse)

för

säsongen 189

Gödningsämnen.

	fosfor- syra	i vatten löslig fosfor- syra	qväfve	kali	pris pr 85 kg	pris pr 100 kg
	0/0	0/0	0/0	0/0		
20 0/0 Superfosfat	—	20	—	—		
18 0/0 d:o	—	18	—	—		
10 0/0 d:o	—	10	—	—		
Thomasfosfat	17	—	—	—		
d:o	15-16	—	—	—		
Bennjöl Schlaffhorsts ångpr:	27-30	—	2-2 ¹ / ₂	—		
Femfaldt Consentreradt kali salt	—	—	—	47-50		
Svafvelsyrad kali Magnesia	—	—	—	15-18		
Kainit	—	—	—	12-14		
Svenskt kali	—	—	—	12		
Halftorr Fiskguano	2	—	3-4	—		
Torr Oblandad d:o	4-7	—	7-8	1		
Torr Kali d:o	10	—	4-5	7-8		
Torr Fältspats d:o	5	—	3	5		
Fisksuperfosfat	—	—	—	—		
Kali Amoniak superfosfat	—	6	4	6-8		
Mossgödnig	—	5	—	8-9		

¹/₂ 0/0 analyseringsspelrum förbehålles.

Foderämnen.

Rapskakor
 Linfrökakor
 Arachid- (Fördnöts) kakor
 Solroskakor
 Hveteekli
 Linfrömjöl

Fett	Protein	Qväfve	85 kg	100 kg

Stenkol, Cokes, Antracitkol, Spannmål, Klöfver-, Gräs- och Rotfruktsfrö, Trävaror, Torfströ och Torfmull, Mejeripreparater och Specierier försäljes till billigaste priser.

Spannmål, Gräsfrö och Trävaror uppköpes.

Falkenberg i 189

HARRY HALLBERG.

Konstgjorda gödningsämnenas olika användning.

Att gifva bestämda föreskrifter om det för hvarje jord eller säde bäst passande gödningsämne, låter sig svårligen göra. Landtmannens egen kännedom om den jord, han brukar, bör i detta afseende lemna honom den bästa vägledningen, om han derjemte iakttagert, att vid uppkomsten af ett nytt gödningsämne dermed anställa försök till jemförande med andra kända gödningsämnen. Framhållas bör att då ingen växt förbrukar endast ett näringsämne, det icke är riktigt att använda t. ex. stora quantiteter fosforsyra der brist på qväfve eller kali finnes, eller tvärtom att använda qväfvehaltiga gödningsämnen, när brist på fosforsyra är för handen, emedan man i begge fallen bortkastar sina penningar.

I allmänhet visar sig förhållandet vara:

att på lerjord är behovet af qväfve företrädesvis störst och att kali icke behöfver tillföras henne;

att all torf- och dyjord är fattig på fosforsyra och merändels äfven på kali samt jemförelsevis rik på qväfve; och

att sämre sandjord har behof af både qväfve, fosforsyra och kali.

Med hänsyn till gödningsämnenas verkan må framhållas att de, som innehålla en samt fosforsyra, böra användas på en jord, som är i god gödningskraft, eller tillsammans med stallspillning, eller ock på omplöjd klöfvervall, samt att de, som innehålla både fosforsyra och qväfve, och särskildt det sistnämnda ämnet i större mängd, bäst ersätta stallspillningen. Detta är ännu mera fallet med de gödningsämnen, hvilka förutan fosforsyra och qväfve äfven innehålla kali. Gödningsämnen, som innehålla endast fosforsyra och kali, lämpa sig bäst för mossar och ängsmark.

Benmjöl är ett långsamt men säkert verkande gödningsämne, som passar bäst på lätt sandjord och på dyjord.

Kalisalterna passa bäst till mossjord och böra der användas tillsammans med superfosfater eller Thomasmjöl.

Bäst är att utsä kalisalterna redan om hösten eller mycket tidigt om våren, hvaremot superfosfaten och benmjölet användas närmast före sådden.

På sandjord gör den svavelsyrade magnesian ofta en mycket god verkan, använd om hösten, då andra af behovet påkallade gödningsämnen användas om våren, t. ex. benmjöl eller fiskguano.

Fiskguano verkar enligt numera vunnne erfarenhet lika hastigt som rå peruguanu, hvilken den i sammansättning kommer nära, och är mycket användbar på lättare jordmån.

Thomasfosfatmjöl användes numera mycket å torf- och dyjord, och våra största mossodlare rekommendera det lifligt såsom ett synnerligen lämpligt och billigt gödningsmedel tillsammans med kali för mossjord.

Ensidig gödning med qväfvehaltiga ämnen befrämjar en kraftig utveckling af stjelk och blad, men ej kärn- eller rotknölsbildningen. Den utarmar dessutom snart jorden på fosforsyra och ofta äfven på kali samt fördröjer växternas mognad.

Ensidig gödning med fosforsyra har deremot till följd att bladens verksamhet för tidigt upphör och växten uppnår därför ej full utveckling.

På jord, på hvilken grödorna lätt brådmogna, motverkas detta bäst med qväfvehaltiga gödningsämnen, och på jord, på hvilken växterna mogna allt för sent, motverkas detta bäst genom en kraftig gödning med fosforsyra.

Vid **sammansatta Superfosfater** beräknas 1 del qväfve, 2 $\frac{1}{2}$ delar löslig fosforsyra och 4 delar kali hafva samma värde. Vid ångprepareradt benmjöl beräknas 1 del qväfve hafva samma värde som 3 delar fosforsyra.

Användes på samma gång qväfve och fosforsyra, så inträffar ej någon menlig verkan af dem. Såsom en fullständigare gödning beräknas 45 kilogram fosforsyra och 30 kilogram qväfve pr hektar = 25 kilogram fosforsyra och 15 kilogram qväfve pr tunnland.

