

Ekou
Kokkum
(M)
1890

Vägledning

till den absolut rena jästens öfverförande i rörelsen.

Jästen försändes (i tjockflytande tillstånd) i ett glas, omviradt med steriliseradt lärft, och inneslutet i en bleckhylsa. Lådan, i hvilken glaset emottages, ställes öppnad på is, till dess jästen skall användas. Glasets innehåll gjutes då omedelbart uti vörten, hvilken kringröres med en ren och nyglaserad krycka.

Den mottagne jästen tillsättes först 5 liter vört vid en temperatur af 13—15° C. När vörten under loppet af några timmar har bildat krus, tillsätts 80 liter vört från kylskeppen vid en temperatur af 9° C. Anställningen sker i ett litet nyglaseradt kärl, rymmande cirka 6 hektoliter och försedt med ett löst lock. Kärlets diameter bör ej vara stor i proportion till höjden.

Emedan dröjsmål af jäsningen på detta första utvecklingsstadium är ödesdiger, är det nödvändigt att tillse att den jäsande vörten icke afkylas under 9° C. Kärlet bör därför antingen placeras i ett rum, der temperaturen är cirka 9° C, eller ock isoleras på passande sätt. Hufvudsaken är emellertid att hafva noggran tillsyn med, att de första 5 liter vört bildat kraftiga krus, innan desamma tillsätts de omnämnda 80 liter vört. Jäsningens vidtagande bör ske hastigt och de första jäsningarne föras kraftigt framåt.

Om vidtagandet i de första 80 liter vört ej börjat efter cirka 24 timmars förlopp, kringröres vätskan ånyo sorgfälligt med en omsorgsfullt rengjord krycka. Efter jästens vidtagande, innan krusbildning börjat, tillsättes ånyo cirka 80 liter vört af samma temperatur som den jäsande vätskan (termometren tvättas med sprit), hvarefter det hela kringröres. När denna jäsning visar vidtagande, tillsättes 2 hektoliter vört af samma temperatur som den jäsande vörten. Sedan denna blandning bildat krus, gjutes all vätskan och den bildade jästen i ett vanligt jästkärl, och man tillsätter 4—5 hektoliter ny vört af samma temperatur som den jäsande vörten. Efter ett ånyo upprepadt tillsättande af vört har man då ett vanligt jästkärl i jäsningstillstånd. Det måste särskildt framhållas såsom ett mycket väsentligt vilkor, att den rena jästen ständigt gjutes i väl rengjorda och nygla-

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2021



National Library
of Sweden

Ekou
Kokkum
(Dn)
1890

Vägledning

till den absolut rena jästens öfverförande i rörelsen.

Jästen försändes (i tjockflytande tillstånd) i ett glas, omviradt med steriliseradt lärft, och inneslutet i en bleckhylsa. Lådan, i hvilken glaset emottages, ställes öppnad på is, till dess jästen skall användas. Glasets innehåll gjutes då omedelbart uti vörten, hvilken kringröres med en ren och nyglaserad krycka.

Den mottagne jästen tillsättes först 5 liter vört vid en temperatur af 13—15° C. När vörten under loppet af några timmar har bildat krus, tillsätts 80 liter vört från kylskeppen vid en temperatur af 9° C. Anställningen sker i ett litet nyglaseradt kärl, rymmande cirka 6 hektoliter och försedt med ett löst lock. Kärlets diameter bör ej vara stor i proportion till höjden.

Emedan dröjsmål af jäsningen på detta första utvecklingsstadium är ödesdiger, är det nödvändigt att tillse att den jäsande vörten icke afkylas under 9° C. Kärlet bör därför antingen placeras i ett rum, der temperaturen är cirka 9° C, eller ock isoleras på passande sätt. Hufvudsaken är emellertid att hafva noggran tillsyn med, att de första 5 liter vört bildat kraftiga krus, innan desamma tillsätts de omnämnda 80 liter vört. Jäsningens vidtagande bör ske hastigt och de första jäsningarne föras kraftigt framåt.

Om vidtagandet i de första 80 liter vört ej börjat efter cirka 24 timmars förlopp, kringröres vätskan ånyo sorgfälligt med en omsorgsfullt rengjord krycka. Efter jästens vidtagande, innan krusbildning börjat, tillsättes ånyo cirka 80 liter vört af samma temperatur som den jäsande vätskan (termometren tvättas med sprit), hvarefter det hela kringröres. När denna jäsning visar vidtagande, tillsättes 2 hektoliter vört af samma temperatur som den jäsande vörten. Sedan denna blandning bildat krus, gjutes all vätskan och den bildade jästen i ett vanligt jästkärl, och man tillsätter 4—5 hektoliter ny vört af samma temperatur som den jäsande vörten. Efter ett ånyo upprepadt tillsättande af vört har man då ett vanligt jästkärl i jäsningstillstånd. Det måste särskildt framhållas såsom ett mycket väsentligt vilkor, att den rena jästen ständigt gjutes i väl rengjorda och nyglaserade kärl samt att alla redskap rensas med största noggranhet, så att hvarje spår af den förut använda jästen omintetgöres. Det är en själfföljd, att jästen först visar sina rasegendomligheter, (smak, attenuation, skärning, klarning o. s. v.) sedan den efter de första jäsningar fullständigt utvecklat sig, och i det hela taget befinner sig under normala förhållanden.

Afsigten med de första små jäsningar är öfverhufvud taget endast den att öka jästmängden. Bedömandet af jästen kan först ske längre fram, sedan jästen utvecklat sig under normala förhållanden.



