

**Matsedlar  
Restauranger 1933  
- samling av  
trycksaker - 2**

*Vardagstryck -1970*



National Library  
of Sweden

# Dragarbrunnns Vårdshus

hålles öppet

**Söckendagar**

kl. 9 f. m.—10 e. m.

**Sön- och Helgdagar**

kl. 1—10 e. m.

*Nya gäster må ej vinna tillträde till restaurangen och rusdrycker må ej till gäst utlämnas senare än 9.30 e. m.*

## Serveringsbestämmelser:

Före kl. 9 f. m. är all utskänkning av viner och före kl. 12 middagen all utskänkning av spritdrycker förbjuden.

### **Spritdrycker.**

Från kl. 12 midd. må till måltid, bestående av lagad mat, serveras högst 5 cl. spritdrycker.

Efter kl. 3 e. m. må till måltid av ovan angivet slag och betingande ett pris av minst Kr. 1:— serveras högst 10 cl. spritdrycker.

I måltidspriset får icke inräknas betalning för i måltiden ingående drycker.

Till *kvinnlig gäst* får vid ett och samma besök utskänkas högst 5 cl. spritdrycker.

Vid servering av **punsch** motsvarar

$\frac{1}{3}$ liter (en halvbutelj)	punsch	15	centiliter	annan	spirituosa
$\frac{1}{6}$ „ (en kvartsbutelj)	„	7,5	„	„	„
$\frac{1}{8}$ „	„	5	„	„	„
5 centiliter	„	2,5	„	„	„

### **Pilsnerdricka.**

Pilsnerdricka må ej till samma person vid samma besök utskänkas till större myckenhet än  $\frac{2}{3}$  liter.

**Medhavda rusdrycker må ej förtäras å restaurangen**



# Diagnostik und Therapie

Die Diagnostik erfolgt durch eine gründliche Anamnese und eine körperliche Untersuchung. In schweren Fällen sind bildgebende Verfahren wie Röntgen, Ultraschall oder CT erforderlich. Die Therapie besteht aus einer symptomatischen Behandlung und, falls notwendig, einer operativen Intervention.

Die Prognose ist in der Regel positiv, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt und behandelt wird. Bei verspäteter Diagnose und Therapie können jedoch schwerwiegende Komplikationen auftreten, die bis zum Tod führen können.

Die Differentialdiagnose umfasst eine Reihe von Erkrankungen, die ähnliche Symptome verursachen können. Dazu gehören Infektionen, Autoimmunerkrankungen, Tumoren und systemische Erkrankungen. Eine sorgfältige Anamnese und eine gezielte Untersuchung sind entscheidend für die Diagnose.

Die Behandlung sollte individuell auf den Patienten abgestimmt sein. Neben der medikamentösen Therapie spielen auch physiotherapeutische Maßnahmen eine wichtige Rolle bei der Rehabilitation.

Die Nachsorge ist ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung, um das Fortschreiten der Erkrankung zu überwachen und bei Bedarf rechtzeitig zu intervenieren.